



SOCIEDADE BRASILEIRA
DE DERMATOLOGIA
Afilada à Associação Médica Brasileira
www.sbd.org.br

50º EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA – 2016

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

1. Este caderno contém as questões da **PROVA TEÓRICA**.
2. Ao receber a **Folha de Respostas**,
 - confira seu nome e número de inscrição;
 - assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.
3. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase retirada do site da SBD:
“Prevenir nunca é tarde demais”.

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

4. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01

A	B	C
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02

A	B	C
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

03

A	B	C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- use apenas caneta esferográfica **azul** ou **preta**;
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente **uma** alternativa em cada questão;
- sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA TEÓRICA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Conforme item **6.12** do Edital, durante o período de realização das Provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. **6.13** O candidato poderá ser submetido a detector de metais e/ou à identificação especial, que compreende a coleta da impressão digital e foto, em sistema informatizado. **6.14** Não será permitido nenhum tipo de consulta a livros, periódicos, compêndios, revistas, impressos, manuais, códigos, anotações ou a qualquer material que contenha informações sobre Medicina. **6.15** É proibido, durante a realização das Provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, de telefone celular, relógio digital, pagers, bipe, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo, e a utilização de qualquer recurso audiovisual próprio, podendo a organização de o Exame vetar a utilização pelo candidato de outros aparelhos além dos anteriormente citados. **6.16** É vedado ao candidato portar arma(s) no local de realização das Provas, mesmo que de posse do respectivo porte. **6.19** Terá a sua Prova anulada e será eliminado do Exame o candidato que incorrer nas seguintes situações: **6.19.5** Ausentar-se da sala de Provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes de decorrido o período fixado para saída; **6.19.7** Não devolver a folha de respostas da Prova teórica ou qualquer outro material solicitado, findo o horário de realização das Provas. **6.19.8** Durante a realização das Provas, se for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma. **6.19.11** Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da Prova, com autoridades presentes e / ou com os outros candidatos; **6.23** Os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto da Prova teórica depois de decorridas **duas horas do início das mesmas**. **6.24** Na Prova teórica, os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

O gabarito preliminar e as questões da Prova Teórica serão divulgados até dia 23 de fevereiro de 2016 no endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br>



ATENÇÃO

Senhor(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **80 (oitenta) questões objetivas** envolvendo conhecimentos de **Dermatologia Clínica, Laboratorial, Cirúrgica e Cosmiátrica**, cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas**, das quais apenas **uma** responde corretamente ao que é solicitado.

Havendo algum problema, informe-o **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, **não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.**

QUESTÃO 1

Em relação à dermatite herpetiforme, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A presença de lesões urticadas é comum.
- B) O infiltrado inflamatório é constituído predominantemente de eosinófilos.
- C) O depósito de IgA nas papilas dérmicas é linear.
- D) Anticorpos antiendomísio são encontrados na minoria dos pacientes.

QUESTÃO 2

Quanto à angiomatose bacilar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os agentes etiológicos mais comuns são a *Bartonella henselae* e *Bartonella quintana*.
- B) É mais observada em pacientes infectados pelo HIV com CD4+ menor que 200 células/ μ l.
- C) As lesões cutâneas são dérmicas superficiais e o acometimento extracutâneo é incomum.
- D) A histopatologia mostra proliferação lobular de capilares e vênulas, células endoteliais arredondadas e protuberantes e denso infiltrado neutrofilico.

QUESTÃO 3

Em relação à utilização da luz de Wood (365 nm) como método semiológico auxiliar para o diagnóstico de algumas dermatoses, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacionando os diagnósticos às colorações mais frequentemente encontradas com o uso dessa técnica.

COLUNA I

1. *Tinea capitis*, causada pelo *Mycrosporium canis*
2. Pitiríase versicolor
3. Eritrasma
4. Carcinoma espinocelular

COLUNA II

- () róseo dourada
- () verde
- () vermelho coral
- () vermelho brilhante (“em brasa”)

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 2 1 3 4
- B) 1 2 4 3
- C) 4 3 1 2
- D) 3 4 2 1

QUESTÃO 4

Quanto ao vírus varicela zoster, é **CORRETO** afirmar:

- A) Um paciente com herpes-zóster pode infectar outra pessoa, e esta ter varicela, caso seja susceptível.
- B) A síndrome de Ramsay-Hunt ocorre devido à reativação do vírus nos gânglios das cadeias paravertebrais torácicas.
- C) A vacina feita com vírus vivo atenuado (cepa de Oka) tem baixa taxa de soroconversão em crianças.
- D) Um indivíduo imunocomprometido, em contato com o fluido das vesículas de paciente com herpes-zóster, pode desenvolver herpes-zóster.

QUESTÃO 5

Em relação às afecções da glândula sudorípara, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A doença de Grover é mais comum em homens caucasianos com mais de 40 anos de idade.
- B) A queratólise esfoliativa, ou disidrose lamelar, não é precedida de vesículas nem tem pápulas concomitantes.
- C) Na histopatologia da disidrose, há uma dermatite espongiótica com vesículas associadas aos ductos sudoríparos.
- D) A doença de Fox-Fordyce é uma alteração crônica e pruriginosa das glândulas sudoríparas apócrinas.

QUESTÃO 6

O retalho de Spear é utilizado para a reconstrução de defeitos:

- A) profundos na região fronto-temporal.
- B) de espessura total da asa nasal.
- C) de espessura total do lábio inferior.
- D) da hélix e da concha auricular.

QUESTÃO 7

Quanto à criocirurgia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) No tratamento das lesões neoplásicas, devem-se atingir temperaturas de cerca de 60 graus negativos dentro do tecido a ser destruído.
- B) Quando se utiliza a ponteira de spray, a aplicação deve ser intermitente para facilitar a frente de congelamento.
- C) A ponteira fechada e congelada possibilita menor congelamento em profundidade, não sendo bem indicada para neoplasias malignas.
- D) É contraindicada em casos de tumores muito espessos e fixos aos planos profundos.

QUESTÃO 8

Em relação à terapêutica sistêmica, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A excreção do fluconazol é feita principalmente pelo fígado, sendo necessário o ajuste da dosagem em hepatopatas.
- B) Os barbitúricos aumentam os níveis plasmáticos da griseofulvina.
- C) O posaconazol tem o maior espectro dentre os azóis, sendo eficaz no tratamento da zigomicose.
- D) O micofenolato de mofetil estimula a proliferação de linfócitos T e B que dependem da via de síntese das purinas.

QUESTÃO 9

Sobre a fototerapia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A UVB de banda estreita (*narrow band*) é inefetiva nos casos graves de dermatite atópica e de dermatite seborreica.
- B) Os tratamentos repetidos, prolongados e com altas doses cumulativas de PUVA podem induzir lentiginose.
- C) A UVB de banda estreita (*narrow band*) tem boa eficácia em casos de prurido idiopático, no de origem hepática e do *diabetes mellitus*.
- D) Nos pacientes tratados com PUVA, o risco de ocorrência de carcinoma espinocelular é significativamente maior que nos controles.

QUESTÃO 10

Quanto aos antibióticos de uso tópico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A neomicina é um polipeptídeo cíclico isolado da cepa Tracey I do *Bacillus subtilis*.
- B) A clindamicina tanto pode ser bacteriostática quanto bactericida, dependendo da susceptibilidade do organismo infectante e da concentração obtida no local.
- C) A retapamulina é o primeiro fármaco da nova classe de pleuromutilinas.
- D) A mupirocina é derivada da *Pseudomonas fluorescens*.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que **não** é considerada uma dermatose paraneoplásica.

- A) *Erythema gyratum repens*
- B) Hipertricose lanuginosa adquirida
- C) Acroqueratose de Bazex
- D) *Ictiosis hystrix*

QUESTÃO 12

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo feminino, caucasiana, 40 anos de idade, previamente hígida, queixa de alopecia de supercílios há um ano, tendo sido tratada com infiltrações intralesionais de triancinolona com repilação temporária. À dermatoscopia da área acometida, notam-se pontos amarelos e pontos pretos.

Considerando esse caso, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As principais hipóteses diagnósticas incluem: alopecia areata, tricotilomania, alopecia frontal fibrosante, sífilis e micose fungoide.
- B) A ausência de pelos peládicos à dermatoscopia não exclui a possibilidade de alopecia areata.
- C) O exame dermatoscópico da linha de implantação frontotemporal do couro cabeludo contribui para o diagnóstico de alopecia frontal fibrosante.
- D) A repilação induzida pelo tratamento confirma o diagnóstico de alopecia areata.

QUESTÃO 13

Em relação aos enxertos cutâneos, é **CORRETO** afirmar que:

- A) estão melhor indicados na correção de defeitos cirúrgicos provenientes da retirada de tumores pouco agressivos.
- B) a vascularização da área receptora pode ser fator limitante na sobrevida do enxerto; e a derme, músculo e tendões são excelentes leitos para o enxerto.
- C) o fenômeno de embebição ocorre nas primeiras 24 horas após a colocação do enxerto no sítio receptor, e se traduz por edema do enxerto em virtude da absorção de nutrientes e exsudato.
- D) a neovascularização do enxerto ocorre entre o 10º e o 14º dia de pós-operatório, com formação de um novo complexo vascular.

QUESTÃO 14

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente de 32 anos, sexo masculino, é portador de hanseníase borderline-boderline, apresentando reação mista, em uso de esquema MDT (sulfona, clofazimina e rifampicina) no quarto mês de tratamento, associado a prednisona (60 mg/dia) e talidomida (200 mg/dia). Após duas horas da administração da dose supervisionada, apresenta quadro de febre, calafrios, cefaleia e osteoalgias, evoluindo para choque. Na investigação laboratorial, foram identificados anemia hemolítica, púrpura trombocitopênica e insuficiência renal.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico para o quadro descrito.

- A) Pielonefrite evoluindo para sepse.
- B) Síndrome sulfona.
- C) Síndrome pseudogripal causada por rifampicina.
- D) Reação anafilática a sulfona ou rifampicina.

QUESTÃO 15

As manifestações clínicas da psoríase variam de acordo com os seus subtipos.

A esse respeito, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A psoríase em placas ou vulgar pode ser observada em até 90% dos doentes.
- B) Na psoríase rupiácea, as escamas são finas e pouco aderentes, e é observada mais frequentemente na infância.
- C) A psoríase em gotas é mais comum em crianças, adolescentes e adultos jovens, podendo ser precedida por infecção estreptocócica.
- D) A psoríase dos idosos ocorre principalmente nos membros inferiores e no couro cabeludo, de forma leve a moderada.

QUESTÃO 16

Em relação à pitiríase rubra pilar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É uma dermatose inflamatória crônica caracterizada por queratoses foliculares circunscritas, placas eritemato-alaranjadas e queratodermia palmoplantar.
- B) É rara, acometendo igualmente ambos os sexos com picos de incidência nas duas primeiras décadas de vida e por volta da quinta e sexta décadas de vida.
- C) Apresenta duas formas clínicas: familiar (início geralmente na adolescência) e esporádica (adultos, sem antecedente familiar e grave).
- D) A forma familiar apresenta provável herança autossômica dominante e existe a expressão de queratinas K6/K16 como marcador de proliferação epidérmica.

QUESTÃO 17

Sobre o líquen nítido, está **CORRETO** afirmar que:

- A) o principal fator etiológico é a infecção por vírus Epstein-Barr.
- B) há maior associação com *diabetes mellitus*.
- C) são descritas as variantes hemorrágica, perfurante e generalizada.
- D) as lesões poupam a área genital.

QUESTÃO 18

Sobre o prurigo nodular de Hyde, é **INCORRETO** afirmar:

- A) É uma dermatose que raramente acomete crianças.
- B) As picadas de insetos podem estar relacionadas ao seu aparecimento.
- C) O prurido é intenso e persistente.
- D) É caracterizado por pápulas e urticas assimétricas.

QUESTÃO 19

Em relação às linhas de Beau, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Ocorrem por alteração inflamatória do leito ungueal.
- B) A profundidade da linha indica a gravidade do acometimento.
- C) Microtraumas e doenças sistêmicas são fatores etiológicos.
- D) A margem distal bem delimitada indica dano agudo.

QUESTÃO 20

Em relação às possíveis complicações relacionadas ao uso da toxina botulínica tipo A, é **CORRETO** afirmar:

- A) Têm menos chance de ocorrer com a utilização da droga mais concentrada.
- B) É frequente a ocorrência de reações alérgicas, e o procedimento deve ser contraindicado em pacientes com história prévia de atopia.
- C) A formação de anticorpos neutralizadores da ação da toxina ocorre invariavelmente após duas aplicações para fins cosméticos.
- D) Para minimizar a difusão da toxina para músculos indesejados, após o procedimento, o paciente deve ser orientado a permanecer deitado durante um período de duas horas.

QUESTÃO 21

Em relação ao carcinoma basocelular, tumor maligno cutâneo mais frequente no nosso meio, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Quando cresce ao longo dos vasos ou do perineuro, a área de invasão é maior e não detectada clinicamente, e as recidivas são frequentes.
- B) O risco de metástase é de 2% e é observado nos padrões histológicos agressivos como o esclerodermiforme e o queratótico.
- C) O superficial e multicêntrico é mais frequente no tronco, mas também ocorre na face.
- D) O infiltrativo mostra células basaloides com arranjo em forma de cordões ou como espículas.

QUESTÃO 22

Considerando o carcinoma espinocelular (CEC), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A papulose bowenoide é o CEC *in situ* dentro de verrugas genitais, geralmente devido a uma infecção viral com cepas oncogênicas.
- B) O carcinoma verrucoso é uma variante mal diferenciada do CEC, que tende a ocorrer em adultos mais idosos e localiza-se na superfície plantar.
- C) A dermatoscopia do CEC invasivo revela vasos lineares irregulares, vasos em grampo, arboriformes e glomerulares e, quando pigmentados, há presença de glóbulos azul-acinzentados.
- D) O uso do micofenolato de mofetil e do sirolimus tem contribuído para o aumento da sua incidência.

QUESTÃO 23

Considerando o dermatofibroma, que é um tumor fibro-histiocitário benigno de etiologia desconhecida, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Lesão de crescimento rápido e que se assemelha a um tumor vascular; corresponde ao tipo histológico aneurismático.
- B) A realização do estudo imunoistoquímico é essencial para diferenciar de tumores fibro-histiocitários malignos (fator VIIIa e CD34 positivos).
- C) A variante celular, denominada de fibro-histiocitoma, caracteriza-se pela grande quantidade de colágeno presente.
- D) Na histopatologia, observam-se hiperplasia de epiderme, hipopigmentação da camada basal, separada por uma zona escura (Grenz) da derme.

QUESTÃO 24

Analise as informações a seguir.

Tumor que predomina no sexo masculino, em torno da sexta e sétima décadas de vida. As áreas fotoexpostas são, frequentemente, as mais acometidas. No exame histopatológico, há presença de células alongadas e amelanóticas envoltas por estroma densamente fibroso. Apesar de apresentar pouca atipia citológica, seu comportamento é agressivo, com grande tendência à recidiva local.

Considerando essas informações, assinale a alternativa que indica a que tipo de melanoma elas estão relacionadas.

- A) Dérmico primário
- B) Desmoplásico
- C) Nevoide
- D) Spitzoide

QUESTÃO 25

Em relação ao melanoma cutâneo, assinale a alternativa que corresponde a um **pioor** prognóstico.

- A) Índice de Breslow de 3,0 mm, fase vertical de crescimento, com regressão.
- B) Índice de Breslow de 1,2 mm, ausência de mitoses, com satelitose.
- C) Índice de Breslow de 0,8 mm, infiltrado linfocítico, com ulceração.
- D) Índice de Breslow de 1,0 mm, nível de Clark IV, 3 mitoses/mm².

QUESTÃO 26

Sobre os procedimentos a seguir, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Está contraindicado o uso da radiofrequência em pacientes portadores de marca-passo e nas áreas de implantes metálicos.
- B) Os melhores resultados na remoção dos pelos são obtidos nos pacientes com pele clara (fototipos I-III) e pelos marrom-escuros a pretos.
- C) As tatuagens amadoras, que contêm mais pigmentos pretos e azuis, baseados em carbono, são mais difíceis de serem removidas com laser.
- D) *Pulsed Dye Laser* (PDL) com comprimento de onda de 585 e 595 nm é o mais eficaz no tratamento das manchas vinho do Porto.

QUESTÃO 27

Linfocitoma cútis é um pseudolinfoma de células B que ocorre em resposta a estímulos conhecidos e desconhecidos. A maioria dos casos é idiopática.

Em relação aos aspectos a seguir, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Ocorre em qualquer idade, sendo mais frequente em mulheres acima dos 60 anos.
- B) Lesões de localização extrafacial são mais comuns no tronco e nos membros superiores.
- C) Manifestações com pápulas medindo alguns milímetros de diâmetro, disseminadas, são denominadas como linfocitoma miliar cútis.
- D) Lesões papulosas ou nodulares, únicas ou múltiplas, de forma localizada, são mais frequentes que a forma generalizada.

QUESTÃO 28

Hiperqueratose e papilomatose, com agregados de células pequenas em meio à epiderme (fenômeno de Borst Jadassohn), são encontradas no seguinte subtipo de queratose seborreica:

- A) clonal.
- B) acantótico.
- C) melanoacantoma.
- D) adenoide.

QUESTÃO 29

Quanto à má-formação vascular, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Ocorre com mais frequência nos prematuros.
- B) O ciclo das células endoteliais é normal.
- C) Há tendência à involução espontânea.
- D) A resposta é adequada à corticoterapia.

QUESTÃO 30

Em relação à dermatomiosite, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As lesões do couro cabeludo fazem diagnóstico diferencial com a dermatite seborreica e a psoríase.
- B) A perfuração de septo nasal, o líquen plano, a doença de Degos e o eritema centrífugo flagelado podem estar associados à dermatomiosite.
- C) Os quadros de artralgia são frequentes, e artrites, quando presentes, são geralmente erosivas e deformantes e com intensa sinovite.
- D) O acometimento dos músculos faciais e bulbares geralmente ocorre quando há associação com neoplasia ou miastenia.

QUESTÃO 31

Em relação ao lúpus eritematoso, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I.

COLUNA I

1. Anticorpo Anti-Ds-DNA
2. Anticorpo Anti-Sm
3. Anticorpo Anti-MA
4. Anticorpo Anti-RO-ssA

COLUNA II

- () Lúpus neonatal
- () Específico LE sistêmico
- () Maior probabilidade de lesão neurológica
- () Acometimento renal

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 2 3 1
- B) 2 4 1 3
- C) 4 1 3 2
- D) 1 3 4 2

QUESTÃO 32

Em relação às micobacterioses, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A produção do fator de necrose tumoral alfa é fundamental para a formação de granulomas, evitando a disseminação de micobactérias.
- B) A relação linfócitos CD4+/CD8+ está aumentada no lúpus vulgar e diminuída no escrofuloderma.
- C) O *Mycobacterium szulgai* é o principal agente do granuloma das piscinas, sendo uma espécie de crescimento rápido em meio de cultura.
- D) A infecção por *Mycobacterium fortuitum* pode ocorrer em implantes mamários e ablações com laser de CO₂.

QUESTÃO 33

A respeito da coinfeção hanseníase e AIDS, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) As reações do tipo 2 da hanseníase são muito mais frequentes nos pacientes com coinfeção com AIDS, comparados àqueles com hanseníase isolada.
- B) Devido à deficiência da imunidade celular decorrente da AIDS, a maioria dos casos de coinfeção com hanseníase se dá na forma virchowiana.
- C) Os pacientes com AIDS, sob uso de TARV (tratamento antiretroviral), podem desenvolver quadros agudos de hanseníase pauci ou multibacilares, que se enquadram na definição de síndrome da restauração imunológica.
- D) Nos casos de coinfeção, frequentemente há necessidade de tratamento mais prolongado para a hanseníase.

QUESTÃO 34

O mecanismo não imunológico envolvido nas reações adversas à drogas, caracterizado pelas modificações do meio ambiente que favorecem o desenvolvimento de certos microrganismos, é denominado:

- A) distúrbio ecológico.
- B) intolerância.
- C) efeito colateral.
- D) biotropismo.

QUESTÃO 35

No que se refere às formas clínicas da sarcoidose, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A forma rosaceiforme simula a rosácea granulomatosa, diferindo desta pela infiltração localizada e superficial.
- B) A forma angiolupoide caracteriza-se por placa eritemato-infiltrada e ovalada na região nasopalpebral ou na vertente nasal, bem delimitada, de consistência endurecida, acometendo quase que exclusivamente o sexo masculino.
- C) O lúpus pérnio caracteriza-se por lesão localizada que acomete principalmente o tronco, com infiltração bem definida e pouquíssimos vasos na superfície.
- D) A manifestação hipodérmica corresponde aos antigos sarcoides subcutâneos de Darrier-Roussy, e é representada por nódulos bem circunscritos, recobertos por pele de cor normal ou rósea.

QUESTÃO 36

Com relação ao *erythema marginatum*, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Ocorre em aproximadamente 20% dos casos de febre reumática aguda.
- B) Inicia-se como pápula ou mácula eritematosa, com forma policíclica, enquanto o centro retorna ao normal, com bordas não induradas, que desaparecem à pressão.
- C) As lesões são proeminentes pela manhã, persistentes, e desaparecem após cerca de 10 dias.
- D) São diagnósticos diferenciais: eritema anular centrífugo, eritema necrolítico, urticária anular, eritroqueratoderma variabilis e doença de Kawasaki.

QUESTÃO 37

São características clínicas da síndrome de Proteus, **EXCETO**:

- A) Crescimento progressivo e assimétrico de extremidades.
- B) Áreas de atrofia dérmica com acentuação do padrão venoso.
- C) Hiperplasia palmoplantar cerebriforme.
- D) Ausência de acometimento de órgãos internos.

QUESTÃO 38

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacionando os critérios dermatoscópicos com suas respectivas representações histopatológicas.

COLUNA I

1. Pontos cinza-azulados
2. Ninhos ovoides
3. Pseudocomedões
4. Estrias brancas brilhosas ou crisálidas

COLUNA II

- () Massas de células basaloides na derme.
() Melanófagos na derme papilar.
() Feixes de colágeno birrefringentes observados apenas com a luz polarizada.
() Acúmulo de queratina nas aberturas foliculares dilatadas.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 1 2 3 4
B) 2 1 4 3
C) 4 1 3 2
D) 3 4 2 1

QUESTÃO 39

Considerando um paciente com uma ferida cutânea pouco exsudativa, qual curativo é **mais** indicado?

- A) Alginato de cálcio.
B) Combinado com colágeno.
C) Hidrocoloide.
D) Carvão ativado.

QUESTÃO 40

Na dermatite atópica, é **CORRETO** afirmar que ocorre aumento da:

- A) resposta de hipersensibilidade retardada.
B) sensibilização pelo DNCB (dinitroclorobenzeno).
C) atividade da enzima fosfodiesterase.
D) resposta *in vitro* dos linfócitos a antígenos microbianos.

QUESTÃO 41

Em relação à dermatite seborreica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A incidência está elevada na doença de Parkinson, na epilepsia, no infarto agudo do miocárdio e nos pacientes em uso de cimetidina.
B) O aumento dos triglicerídeos e do colesterol com diminuição do esqualeno e ácidos graxos livres é observado na secreção sebácea.
C) A exposição ao Sol diminui sua intensidade, enquanto o frio, o *stress* emocional e o físico agravam o quadro clínico.
D) A forma infantil tem correlação com a dermatite seborreica do adulto.

QUESTÃO 42

São critérios diagnósticos para a dermatite infectiva, **EXCETO**:

- A) Rinorreia crônica.
B) Febre elevada.
C) Pronta resposta à terapia antibacteriana.
D) Soro positividade para HTLV-1.

QUESTÃO 43

Considerando os retalhos cutâneos, é **CORRETO** afirmar:

- A) Na dinâmica dos retalhos, existem dois movimentos: o primário, que representa seu próprio movimento, e o secundário, gerado pelo deslocamento da pele ao redor do defeito cirúrgico.
B) A elasticidade e a mobilidade da pele a ser utilizada são maiores em pacientes jovens quando comparadas a dos idosos.
C) A relação entre o comprimento do retalho e o tamanho do pedículo deve ser em torno de 3:1, mas quando há uma artéria na base do pedículo, esta relação deve ser menor.
D) De acordo com a movimentação, os retalhos são classificados em parcial e total.

QUESTÃO 44

Com relação ao eritema nodoso, é **INCORRETO** afirmar:

- A) Trata-se de uma paniculite lobular.
B) Pode estar associado à sarcoidose e à hanseníase.
C) Há infiltrado neutrofilico nas lesões iniciais.
D) Representa uma resposta de hipersensibilidade retardada.

QUESTÃO 45

Assinale a alternativa que **não** apresenta uma característica das erupções acneiformes.

- A) Surgem abruptamente.
- B) Há ausência de comedões.
- C) Ocorrem em áreas típicas da acne vulgar.
- D) As lesões são pápulo-pustulosas, de caráter monomorfo.

QUESTÃO 46

Numere a COLUNA I de acordo com a COLUNA II, relacionando a droga com seu efeito colateral.

COLUNA I

1. Ciclofosfamida
2. Isotretinoína
3. Hidantoína
4. Cloroquina

COLUNA II

- () Eflúvio telógeno
- () Hipertricose
- () Alterações da cor do cabelo
- () Eflúvio anágeno

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 1 2 3 4
- B) 2 3 4 1
- C) 3 4 1 2
- D) 4 1 2 3

QUESTÃO 47

Sobre a acne da mulher adulta, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As lesões inflamatórias localizam-se especialmente no terço inferior da face.
- B) O grau de oleosidade facial é menor do que nos casos da acne juvenil.
- C) O surgimento é súbito com ou sem história de acne na adolescência.
- D) Quando associada à síndrome do ovário policístico, há diminuição da relação LH/FSH.

QUESTÃO 48

Em relação à acne *fulminans*, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Há associação com febre e hepatoesplenomegalia.
- B) O acometimento ósseo é frequente.
- C) Ocorre mais no tórax e dorso.
- D) É mais comum em jovens do sexo feminino.

QUESTÃO 49

Sobre as dermatozoonoses, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Na miíase migratória, há a deposição de ovos da *Dermatobia hominis* que provoca uma erupção serpiginosa na pele humana.
- B) Na tungíase, o quadro clínico é produzido pela fêmea da *Tunga penetrans* que se fixa na pele do hospedeiro com a finalidade de ovulação.
- C) Na dermatite vesicante por *Paederus*, a responsável pelo surgimento das lesões é a pederina, que é liberada quando o inseto é tocado ou esmagado.
- D) Na demodicidose, o *Demodex foliiculorum* é observado no infundíbulo folicular, e o *Demodex brevis*, nos ductos sebáceos e nas glândulas de Meibomio.

QUESTÃO 50

Com relação à escabiose, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A sarna crostosa ocorre em indivíduos neuropatas e pode ser uma manifestação da infecção pelo HTLV-1.
- B) O prurido é desencadeado por um mecanismo alérgico e outro mecânico.
- C) O efeito antabuse associado ao monossulfiram pode ocorrer quando da ingestão de álcool até 10 dias após a aplicação da medicação.
- D) A ivermectina oral está indicada no tratamento de crianças, a partir dos 6 meses de idade.

QUESTÃO 51

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo masculino, agricultor, apresenta, há cerca de seis meses, aumento do volume do pé esquerdo acompanhado de lesões nodulares e gomosas que eliminam material espesso e grãos de coloração preta. O exame microscópico direto a fresco demonstrou grãos compostos por filamentos micelianos de parede dupla, clamidósporos abundantes e ausência de clavos. A cultura em ágar Sabouraud dextrose apresentou-se como branca com micélio aéreo curto cinza e na microcultura observou-se conidióforos simples e conídios ovais. O exame histopatológico demonstrou processo inflamatório supurativo ao redor do grão.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o agente etiológico desse micetoma eumicótico.

- A) *Madurella grisea*
- B) *Madurella mycetomatis*
- C) *Acremonium recifei*
- D) *Pseudallescheria boydii*

QUESTÃO 52

Sobre as dermatofitoses, é **CORRETO** afirmar:

- A) Na tinha do couro cabeludo microspórica, as lesões são múltiplas enquanto na tricofítica é única.
- B) A tinha do corpo tem como variante clínica o granuloma de Majocchi, usualmente causado pelo *Trichophyton Rubrum*.
- C) A tinha favosa causada pelo *Trichophyton concentricum* é considerada rara nos dias de hoje.
- D) A tinha imbricada, também denominada de “chimberê”, tem como agente etiológico o *Microsporum gypseum*.

QUESTÃO 53

Considerando o diagnóstico etiológico da cromoblastomicose, é **CORRETO** afirmar:

- A) No Brasil, o agente etiológico predominante é *Chadophialophora carrionii*.
- B) Os agentes etiológicos apresentam aspecto macromorfológico semelhante na cultura, sendo necessário o microcultivo para o diagnóstico da espécie.
- C) A espécie *Fonsecaea pedrosoi* apresenta mais frequentemente a esporulação tipo *phialophora*.
- D) Na esporulação tipo *cladosporium*, o conidióforo tem aspecto de vaso, e os esporos se agrupam no topo ou ao seu redor.

QUESTÃO 54

Com relação às psicodermatoses, é **CORRETO** afirmar:

- A) A dismorfofobia assemelha-se à distorção da imagem corporal da anorexia.
- B) A tricotilomania da criança é mais comum em meninos, sendo incomum a resolução espontânea.
- C) Na dermatite artefacta, observam-se lesões simétricas ao alcance do membro superior dominante.
- D) Na pantomínia, o paciente agrava uma lesão já existente, que passa a ter aspecto bizarro.

QUESTÃO 55

Analise o quadro clínico a seguir.

Criança do sexo masculino, branca, nascida a termo, bom estado geral, afebril, apresenta no terceiro dia de vida quadro cutâneo composto de máculas eritematosas localizadas no tronco, algumas delas encimadas por pústulas de nítida localização folicular. O exame histopatológico revelou acúmulo intrafolicular maciço de eosinófilos, e o quadro apresentou regressão espontânea aos 15 dias de vida.

Diante desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica desse paciente.

- A) Melanose pustulosa transitória
- B) Miliária rubra
- C) Eritema tóxico do recém-nascido
- D) Folliculite pustulosa eosinofílica

QUESTÃO 56

O achado de vasos em coroa à dermatoscopia é característico de:

- A) melanoma fino.
- B) hiperplasia sebácea.
- C) doença de Bowen.
- D) granuloma piogênico.

QUESTÃO 57

Em relação às características clínicas da síndrome de Sweet, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O estado geral é comprometido, com febre, prostração e mialgia.
- B) As lesões cutâneas acometem preferencialmente os membros inferiores.
- C) O fenômeno de patergia ocorre, assim como no pioderma gangrenoso.
- D) O acometimento oral é mais comum quando há doença hematológica associada.

QUESTÃO 58

Diante de uma suspeita clínica de mastocitose, qual tipo de coloração pode auxiliar no exame histopatológico?

- A) Vermelho Congo.
- B) Azul de toluidina.
- C) Sudan (Sudan black).
- D) Tricrômico de Masson.

QUESTÃO 59

Assinale a alternativa cujo marcador imunistoquímico é indicativo de proliferação celular.

- A) CK7
- B) Melan A
- C) Ki 67
- D) CD 34

QUESTÃO 60

Assinale a alternativa que representa o padrão clínico que pode ser encontrado no mosaicismismo cutâneo.

- A) Filoide
- B) Anular
- C) Zosteriforme
- D) Reticular

QUESTÃO 61

Em relação à dermatose bolhosa crônica da infância, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Há presença de bolha subepidérmica.
- B) Há acometimento mucoso.
- C) A imunofluorescência direta é positiva para IgG.
- D) Há tendência à remissão.

QUESTÃO 62

Considerando o xantogranuloma juvenil, é **CORRETO** afirmar:

- A) A dislipidemia pode preceder as lesões cutâneas.
- B) O encontro de células de Touton na histopatologia é característico.
- C) As células são CD1a positivas na imunoistoquímica.
- D) Ocorre mais frequentemente nos membros inferiores.

QUESTÃO 63

A mastocitose pode ser desencadeada por algumas substâncias.

Assinale a substância que **não** está associada à exacerbação do quadro cutâneo.

- A) Álcool
- B) Hioscina
- C) Contrastes iodados
- D) Cromoglicato de sódio

QUESTÃO 64

Em relação à neuropatia hansênica, é **INCORRETO** afirmar:

- A) Na forma tuberculoide, a lesão neural cursa com reação granulomatosa e, em alguns casos, necrose dos nervos superficiais e profundos.
- B) Na forma borderline, vários troncos nervosos podem ser afetados, com maior incidência de mononeuropatias múltiplas.

- C) Na forma indeterminada, os ramos superficiais dos nervos são comprometidos, sendo poupados os troncos neurais.
- D) Na forma virchowiana, o comprometimento neural é, na maioria dos casos, assimétrico, isolado e unilateral.

QUESTÃO 65

Com relação à imunologia da hanseníase, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Os pacientes com a forma tuberculoide desenvolvem vigorosa resposta imune celular do tipo Th1, com produção, em grande magnitude, das citocinas IL-10, TGF- β , TNF- α e IL-2.
- B) Os pacientes com a forma virchowiana desenvolvem resposta imune do tipo Th2, com importante produção das citocinas IFN- γ , IL2, TNF- α , IL-4.
- C) Os pacientes com formas multibacilares apresentam maior soropositividade de anticorpos anti-PGL-1 que os pacientes paucibacilares.
- D) Na reação tipo 1, ocorre exacerbação da resposta imune do tipo Th2, capaz de produzir danos irreversíveis aos nervos periféricos.

QUESTÃO 66

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacionando as colorações especiais com as suas possíveis aplicações nos seguintes diagnósticos.

COLUNA I

1. Alcian blue
2. Verhoeff
3. Azul da Prússia
4. Tricrômio de Masson

COLUNA II

- () Leiomiomas
- () Granuloma anular
- () Sarcoma de Kaposi
- () Anetodermia

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 1 4 2 3
- B) 2 3 1 4
- C) 3 1 4 2
- D) 4 2 3 1

QUESTÃO 67

A respeito da acrodermatite enteropática, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Quando hereditária, tem caráter autossômico recessivo.
- B) As lesões surgem após a retirada do leite materno.
- C) O crescimento e o desenvolvimento do indivíduo são normais.
- D) Há maior predisposição às infecções fúngicas e bacterianas.

QUESTÃO 68

Sobre a unidade epidermo-melânica, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É formada pela associação do melanócito com queratinócitos presentes apenas na camada basal da epiderme.
- B) A interação entre os melanócitos e os queratinócitos se dá através da via das caderinas.
- C) A densidade dos melanócitos na epiderme por milímetro quadrado não varia de acordo com a localização anatômica no mesmo indivíduo.
- D) O principal fator determinante da cor da pele normal é a densidade dos melanócitos na epiderme.

QUESTÃO 69

Em relação à adiponecrose do recém-nascido, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A resolução espontânea é comum.
- B) As lesões têm uma distribuição frequentemente simétrica.
- C) Há associação com hipercalemia.
- D) Ocorre mais comumente em recém-nascidos pré-termo.

QUESTÃO 70

Em relação à doença de Kyrle, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Acomete frequentemente pacientes renais crônicos ou diabéticos com algum grau de nefropatia.
- B) Ocorre em associação com doenças pruriginosas, como escabiose, picadas de inseto ou linfoma.
- C) Surge em regiões previamente sujeitas a traumatismos ou em pacientes que fazem uso de inibidores do TNF alfa ou indinavir.
- D) O sítio anatômico frequentemente acometido é o dorso e o abdome.

QUESTÃO 71

Sobre a síndrome do choque tóxico estafilocócico, é **CORRETO** afirmar:

- A) A enterotoxina C₁ é a mais frequentemente envolvida.
- B) Há eritema difuso acompanhado de edema palmoplantar.
- C) Em geral, não há comprometimento muscular nem hepático.
- D) A maioria dos casos ocorre no sexo masculino.

QUESTÃO 72

Analise o caso clínico a seguir.

Criança de 4 meses apresenta hemangioma infantil combinado ocupando toda a região periorbital direita.

Devido ao risco de complicações oftalmológicas, o tratamento de escolha para esse caso é:

- A) interferon.
- B) vincristina.
- C) exérese cirúrgica.
- D) betabloqueador oral.

QUESTÃO 73

Sobre os nevos melanocíticos adquiridos na infância, é **CORRETO** afirmar que:

- A) quando S-100 positivos, o risco de malignização na vida adulta é maior.
- B) a maioria corresponde histologicamente a nevos intradérmicos.
- C) o padrão dermatoscópico globular é o mais comumente identificado.
- D) o couro cabeludo é um local raramente acometido.

QUESTÃO 74

Em relação à sífilis, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Na neurosífilis parenquimatosa, a demência paralítica é uma meningoencefalite crônica com comprometimento progressivo das funções psíquicas.
- B) Na *tabes dorsalis*, a presença do sinal de Romberg é pouco frequente.
- C) Na forma tardia, a presença de goma localizada na região peniana constitui o chamado pseudocâncer *redoux*.
- D) Na forma cardiovascular, a porção ascendente da aorta é a região mais acometida, especialmente sua raiz, por ser a parte mais rica em *vasa vasorum*.

QUESTÃO 75

Quanto ao linfoma cutâneo de células B, assinale a alternativa que representa o tipo no qual o comportamento clínico **é mais** indolente.

- A) Centro-folicular
- B) Intravascular
- C) Difuso, tipo perna
- D) De células do manto

QUESTÃO 76

Com relação à epidemiologia da leishmaniose tegumentar Americana (LTA), é **INCORRETO** afirmar:

- A) A forma anérgica difusa da LTA ocorre na Amazônia brasileira, sendo causada pelas espécies *Leishmania (Leishmania) amazonensis* e *Leishmania (Viannia) braziliensis*.
- B) Devido ao seu caráter ocupacional, a LTA acomete mais indivíduos do sexo masculino, na faixa etária de 20 a 40 anos.
- C) São três os perfis epidemiológicos da LTA: LTA silvestre (áreas de desmatamento recente); LTA silvestre modificada (áreas de desmatamento antigo); LTA periurbana.
- D) A leishmaniose cutânea localizada é causada, no Brasil, na maioria das regiões, pela *Leishmania (Viannia) braziliensis*; podendo também ser causada, na região Norte, pela *Leishmania (Viannia) guyanensis*, *Leishmania (Leishmania) amazonensis* e outras de menor importância.

QUESTÃO 77

Em relação ao nevo de Becker, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Ao exame histopatológico, os ninhos de células névicas são predominantemente juncionais.
- B) Quando firme à palpação, sugere associação com hamartoma do músculo liso.
- C) A maioria surge na primeira década de vida.
- D) A hipertricose usualmente precede a hiperpigmentação.

QUESTÃO 78

Em relação aos acidentes por animais peçonhentos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os *Millepodes*, ou “piolhos de cobra”, liberam quinonas que provocam pigmentação escura e necrose superficial da pele.
- B) A pederina, existente nos besouros do gênero *Paederus*, tem as mesmas propriedades irritantes cutâneas da cantaridina.
- C) Nos acidentes agudos com peixes venenosos, a melhor conduta é a imersão do membro em água fria, uma vez que os venenos são potentes vasodilatadores.
- D) O veneno das serpentes do gênero *Bothrops* tem ação proteolítica, coagulante e hemorrágica.

QUESTÃO 79

Quanto às formas clínicas da esporotricose, é **INCORRETO** afirmar:

- A) A forma cutâneo-localizada reflete alto grau de imunidade do hospedeiro, sendo mais comumente localizada na face e nos membros.
- B) A forma cutâneo-linfática é a mais comum no nosso meio, formando cordões rijos em trajeto linear, com nódulos profundos, múltiplos, muito dolorosos, que raramente ulceram, sendo, na grande maioria dos casos, bilaterais.
- C) A forma cutâneo-disseminada é rara, sendo mais comum em indivíduos imunocomprometidos, com lesões múltiplas, sobretudo gomas e abscessos, podendo ainda apresentar pápulas, nódulos subcutâneos, lesões verrucosas e úlcerovegetantes.
- D) As formas extracutâneas acometem principalmente o sistema esquelético, a boca, a faringe, o nariz, os olhos, os pulmões e o sistema nervoso.

QUESTÃO 80

Em relação à síndrome da pele excitada ao teste de contato (*angry back*), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A repetição do patch teste está contraindicada.
- B) Relaciona-se a um pior prognóstico, com eczemas mais crônicos.
- C) Representa uma possível causa de falso-positivo.
- D) O corticoide oral é indicado devido ao risco de anafilaxia.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
66	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
69	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
71	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
74	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
77	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
79	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**