

1995 - XVIII EXAME DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA

1. Na Pitiríase Rósea causada por drogas, as mais freqüentemente responsáveis são:

- a) Ácido acetil-salicílico - Dipirona - Paracetamol
- b) Vancomicina - Ibuprofeno - Naproxeno
- c) Glutamida - Quinina - Hidralazina
- d) Captopril - Metronidazol - Griseofulvina
- e) Penicilina - Cimetidina - Hidroclorotiazida

2. É contra-indicação para fazer o tratamento com PUVA:

- a) HIV positivo
- b) psoríase pustulosa
- c) PLEVA
- d) radioterapia prévia
- e) dermatite atópica

3. O molusco contagioso que se apresenta clinicamente como pápulas umbelicadas, translúcidas pertence ao grupo:

- a) Papovavírus
- b) Poxvírus
- c) Retrovírus
- d) Togavírus
- e) Herpesvírus

4. O tratamento de escolha do acne cístico (conglobata) é:

- a) sulfadiazina
- b) antibióticos de largo espectro por longos períodos
- c) drenagem e infiltração de corticosteróide intralesional
- d) indometacina
- e) isotretinoína

5. A acrodermatite enteropática tem como terapêutica mais importante:

- a) prednisona em doses baixas e prolongadas
- b) ácido picolínico
- c) nistatina
- d) sulfato de Al e Bi
- e) sulfato de zinco

6. Trabalhador da construção civil, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI), apresentando quadro eczematoso e pruriginoso em mãos, possivelmente estará sensibilizado a:

- a) níquel
- b) mercúrio
- c) cromo
- d) solventes
- e) sílica

7. No tratamento de zóster, a primeira escolha terapêutica é

- a) analgésicos e vitamina B6
- b) repouso e compressas de Burrow a 1:20
- c) analgésicos e vitamina B12
- d) interferon tópico
- e) aciclovir VO

8. Na eritroplasia de Queyrat pode-se ter como tratamento de primeira escolha:

- a) bleomicina intralesional
- b) radioterapia das lesões pequenas
- c) 5-fluoracil (5-FU)
- d) infiltração intralesional de corticóide
- e) neve carbônica

9. A Dermatite ocre-pigmentar de Favre-Chaix é também conhecida como:

- a) Púrpura pigmentosa

- b) Púrpura Hipostática
- c) Púrpura de Schaumberg
- d) Púrpura de Majocchi
- e) Dermatite Purpúrica de Gougerot-Blum

10. O tipo de dermatose ocupacional mais freqüente em nosso meio é:

- a) dermatite de contato por irritante primário
- b) dermatite e contato por sensibilização
- c) discromia
- d) elaiocnirose
- e) fotossensibilização por salicilanilidas

11. Existe uma diminuição da incidência da acne vulgar em portadores de:

- a) dermatite seborréica
- b) alopecia androgenética
- c) hipertricose
- d) diabetes
- e) dermatite atópica

12. O tratamento de primeira escolha da dermatomiosite é:

- a) ciclofosfamida
- b) MTX
- c) prednisona
- d) triamcinolona
- e) dapsona

13. O sinal de Asboe-Hansen revela patogenicamente alteração da:

- a) ceratohialina
- b) laminina
- c) lâmina lúcida
- d) desmogleína

e) colágeno

14. Na sífilis secundária, não é verdadeiro o fato de:

- a) existirem linfadenopatias em mais de 85% dos pacientes
- b) haver hepatite em cerca de 10% dos casos
- c) poder existir dano do 8o par craniano, com surdez neurosensorial
- d) haver glomerulonefrite difusa aguda, regredindo com a terapêutica
- e) ser a irite a complicação mais comum nos olhos, em cerca de 3% dos casos

15. O tratamento de eritrasma pode ser feito com:

- a) cetoconazol
- b) griseofulvina tópica
- c) eritromicina tópica
- d) tetraciclina VO
- e) uréia 10%

16. No epiteloma basocelular superficial, obtém-se a cura com bom resultado estético, menor dispêndio de tempo e custo acessível executando-se:

- a) excisão e sutura
- b) eletrocoagulação
- c) tretinoína
- d) crioterapia
- e) radioterapia

17. Com relação a alopecia androgenética, o que está correto é:

- 1 - os indivíduos castrados antes da puberdade não ficam calvos.
- 2 - ocorre também em macacos.
- 3 - ocorre em homens e mulheres.

- a) a 1ª afirmativa
- b) a 2ª afirmativa
- c) a 3ª afirmativa

- d) todas as afirmativas
- e) nenhuma afirmativa

18. As síndromes de Jadassohn-Lewandowsky e de Zinsser-Cole-Engmann (disceratose congênita) apresentam clinicamente em comum:

- a) poiquilodermia
- b) discrasias sangüíneas
- c) alterações mucosas
- d) paquioníquia
- e) ceratose solar

19. No doente com HIV positivo e sífilis secundária, é indicado:

- a) penicilina benzatina em dose baixa, por longo período (mínimo de seis meses)
- b) penicilina benzatina em doses altas
- c) penicilina cristalina
- d) eritromicina
- e) tetraciclina

20. Na distrofia mediana canaliforme da unha (distrofia de Heller), pode-se afirmar que:

- a) é devida a doenças sistêmicas reumáticas
- b) é atribuída a trauma
- c) tem caráter permanente
- d) não tem preferência por determinado dedo
- e) é devido a doenças sistêmicas circulatórias

21. Perfuração de septo nasal na indústria pode ser causada por:

- a) mercuriais orgânicos
- b) mercuriais inorgânicos
- c) cromo hexavalente
- d) cobalto
- e) níquel

22. O sinal de Nikolsky pode não estar presente no:

- a) Pênfigo vulgar
- b) Penfigóide bolhoso
- c) Pênfigo de Cazenave
- d) Pênfigo foliáceo
- e) Pênfigo vegetante

23. Dismorfofobia ou hipocondria cutânea freqüentemente desencadeiam-se após quadro prévio de:

- a) psoríase
- b) líquen plano
- c) acne
- d) alopecia areata
- e) vitiligo

24. Na dermatite herpetiforme, temos, como primeira opção terapêutica:

- a) dapsona
- b) prednisona
- c) sulfadimetoxina
- d) ciclofosfamida
- e) eritromicina

25. No eczema de contato medicamentoso é possível comprovar a substância responsável através de:

- a) testes epicutâneos com a substância diluída
- b) teste intradérmico com a substância suspeita
- c) citodiagnóstico de Tzanck
- d) microscopia óptica comum
- e) microscopia eletrônica

26. O tratamento inicial do Penfigóide Cicatricial pode ser feito com:

- a) Penicilamina
- b) Sulfona
- c) Antimalárico
- d) Eritromicina
- e) Tetraciclina

27. Um estudo computadorizado em pacientes com acne vulgar revelou:

- a) aumento da acne com aumento da ingestão de carboidratos
- b) diminuição da acne com administração de vitaminas A e E
- c) aumento da acne com aumento na ingestão de lípidos
- d) diminuição da acne com aumento na ingestão de proteínas
- e) nenhuma alteração da acne com o aumento na ingestão de calorias e aminoácidos

28. No indivíduo atópico, os níveis de IgE costumam estar acentuadamente elevados quando apresentam:

- a) eczema atópico associado a eczema de contato
- b) eczema atópico e manifestação respiratória
- c) eczema atópico infectado
- d) eczema atópico subagudo
- e) eczema atópico liquenificado

29. Doente com dermatite de contato por timerosal deve ser orientado a não utilizar futuramente:

- a) piroxicam
- b) claritromicina
- c) sulfametoxazol-trimetoprim
- d) penicilina-benzatina
- e) cetirizine

30. Na esclerose tuberosa há hipopigmentação:

- a) em placas múltiplas arredondadas e de contorno nítido
- b) em placas múltiplas ovaladas em forma de folha

- c) em torno dos olhos e do nariz
- d) difusa nas extremidades
- e) generalizada em forma de confete

31. Sítio de obtenção do antígeno e critério de positividade para o teste de Kweim são, respectivamente:

- a) pulmão, granuloma histológico
- b) linfonodo, pápula maior que 5mm
- c) baço, granuloma histológico
- d) pulmão, pápula maior que 5mm
- e) baço, pápula maior que 5mm

32. Na Epidermolise Bolhosa Adquirida, o primeiro diagnóstico diferencial deve ser feito com:

- a) Porfíria cutânea tarda
- b) Pênfigo cicatricial
- c) Pênfigo de Hailley-Hailley
- d) Pênfigo de Senear-Usher
- e) Dermatite Herpetiforme

33. A radiação UVB, na dose de 3 DEM pode causar, nas primeiras 48-72 horas:

- a) eritema e diminuição dos linfócitos T supressores
- b) eritema e desaparecimento das células de Langerhans
- c) eritema e aumento do número de macrófagos
- d) eritema e aumento do número de linfócitos T supressores
- e) eritema e diminuição de eosinófilos

34. No eritema fixo pigmentado medicamentoso, o exame histopatológico pode demonstrar:

- a) o pigmento correspondente à droga enegrecida
- b) melanina
- c) hemosiderina
- d) bilirrubina



e) lipofucsina

35. O eritema pérnio representa:

- a) denominação geral dos eritemas que ocorrem nas pernas
- b) localização nas pernas de reação adversa medicamentosa
- c) manifestação relacionada com o calor ambiental
- d) manifestação relacionada com o frio ambiental
- e) manifestação primária das eritrodermias

36. Na urticária ao frio na forma familiar qual o tipo de herança:

- a) autossômica dominante
- b) autossômica recessiva
- c) herança ligada ao cromossoma X recessiva
- d) herança ligada ao cromossoma X dominante
- e) herança poligênica

37. Diascopia, dermatoscopia e capilaroscopia são métodos auxiliares para diagnóstico principal e respectivamente de:

- a) lupus vulgaris, psoríase e eczema
- b) lupus vulgaris, nevo e eczema
- c) sarcoidose, melanoma e lupus eritematosus
- d) sarcoidose, melanoma e atopia
- e) psoríase, nevo e dermatomiosite

38. No iododerma, as lesões são sempre:

- a) maculosas
- b) somente vegetantes
- c) polimorfas
- d) apenas pruriginosas
- e) nunca vegetantes

39. Das afirmativas abaixo, o que está correto:

1 - a intoxicação causada pelo thalium que provoca alopecia pode ser neutralizada pelo bicarbonato de sódio.

2 - o ácido bórico, tomado com a intenção de suicídio, causa alopecia total após 10 dias.

3 - a hipervitaminose A que provoca alopecia pode ser comprovada pela excreção urinária da vitamina.

- a) a 1ª
- b) a 2ª
- c) a 3ª
- d) todas
- e) nenhuma

40. Os ácidos dicarboxílicos, produzidos pelos fungos do gênero *Pityrosporum*, provavelmente têm ou promovem:

- a) preferência pelos folículos pilosos
- b) despigmentação cutânea
- c) lipofilia do fungo
- d) estímulo da tirosinase dos melanócitos
- e) produção de escamas pitiriásicas

41. Na sarcoidose, podemos encontrar:

- a) anergia tuberculínica
- b) hipercalcemia
- c) hipercalcúria
- d) todos acima
- e) somente respostas a e c

42. A reação da cadeia de polimerase (PCR) confirmou, recentemente, a etiologia tuberculosa de:

- a) lúpus vulgar
- b) eritema indurado de Bazin
- c) escrofuloderma

d) lúpus pérnio

e) a e c

43. A radioterapia pode ser o tratamento de primeira escolha na:

a) hiperidrose palmar

b) sarcoma de Kaposi clássico

c) carcinoma basocelular esclerodermiforme

d) carcinoma espinocelular das extremidades

e) linfocitoma cútis

44. A histoplasmose:

a) aumentou sua incidência com o advento da SIDA

b) difere da tuberculose por não produzir calcificações pulmonares

c) se adquire a partir de fungos no solo, de fezes de morcegos e de urina de ratos

d) apresenta todas as características acima

e) somente os itens a e c

45. Dos erros de conduta abaixo, assinale o de maior potencial deletério:

a) excisão e sutura de verruga plantar

b) excisão de tumor glômico após anestesia com adrenalina

c) biopsia com "punch" em epidermólise bolhosa

d) eletrocoagulação de epitelioma basocelular maior que 2,0cm

e) excisão e sutura de verruga seborréica

46. Além de *M. marinum*, *M. kansasii*, *M. ulcerans*, tem interesse dermatológico:

a) *Mycobacterium avium-intercellulare*

b) *Mycobacterium szulgai*

c) *Mycobacterium scrofulaceum*

d) todos acima

e) a e c

47. O teste mais rápido para o diagnóstico diferencial etiológico - drogas X estafilococcia - necrólise epidérmica tóxica é:

- a) método de Amon-Diamond
- b) imunofluorescência direta
- c) imunofluorescência indireta
- d) anamnese
- e) histopatologia

48. Assinale a afirmativa correta:

- a) as varicosidades palmares e digitais ocorrem principalmente nas mulheres
- b) as telangiectasias agrupadas em forma de arbustos ocorrem predominantemente no tronco de pessoas idosas
- c) os angiomas senis ou lagos venosos ocorrem principalmente na face e lábios de idosos
- d) as telangiectasias não tem importância no diagnóstico das colagenoses
- e) as telangiectasias não tem tratamento satisfatório

49. Qual a alteração mais comum nas unhas dos indivíduos idosos, acima dos 50 anos de idade:

- a) pontos brancos
- b) sulcos longitudinais
- c) sulcos transversais
- d) depressões puntiformes
- e) descolamento distal

50. Na liquenificação vulgar circunscrita:

- a) o atrito não interfere na lesão
- b) o atrito pode ser desencadeante e agravante
- c) o atrito atua somente como desencadeante
- d) é a expressão mais comum de farmacodermia
- e) desaparece completamente com o uso de antibióticos

51. O prurido genital na mulher, pode ser uma manifestação de:

- a) Diabetes
- b) Hipertireoidismo
- c) Hiperaldosteronismo
- d) Menopausa
- e) Hipertensão

52. O estrato lúcido está presente em:

- a) regiões palmares e plantares
- b) glande
- c) dobras da pele
- d) pálpebras e pavilhões auriculares
- e) prepúcio

53. Além da etiologia estreptocócica e estafilocócica, as celulites, mais raramente, podem ser causadas por:

- a) *Haemophilus influenzae*
- b) *Pasteurella multocida*
- c) *Pseudomonas aeruginosa*
- d) todos acima
- e) somente a e c

54. O frinoderma é uma doença metabólica que se caracteriza por pele seca, áspera e ceratose folicular e é devida a deficiência de:

- a) vitamina B1
- b) vitamina A
- c) selênio
- d) manganês
- e) zinco

55. A necrobiose lipoídica ocorre:

- a) sempre nos portadores de insuficiência renal
- b) sempre nos portadores de hipertireoidismo

- c) algumas vezes em diabéticos
- d) obrigatoriamente em viciados de drogas de uso intravenoso
- e) como decorrência exclusiva de substâncias não absorvidas na derme

56. No Estrófulo já instalado, as lesões em grande número são decorrentes de:

- a) Grande número de picadas
- b) Progressão das picadas
- c) Por transmissão ao coçar
- d) Por via hematogênica de lesão para lesão
- e) Por ressuscitamento de picadas antigas

57. No herpes simples genital, qual das doenças abaixo podemos incluir no diagnóstico diferencial:

- a) cancro mole
- b) escabiose nodular
- c) papulose bowenóide
- d) condiloma acuminado
- e) Líquen plano anular

58. Das afirmativas sobre elastose actínica, o que está certo:

- 1 - pode vir acompanhada de comedões e cistos foliculares em torno dos olhos.
- 2 - pode complicar-se com o aparecimento do chamado granuloma actínico.
- 3 - nunca ocorre na raça negra

- a) a 1ª e a 2ª
- b) a 2ª e a 3ª
- c) todas
- d) apenas uma
- e) nenhuma

59. A associação da SIDA com a hanseníase:

- a) tende a aumentar a incidência das formas virchowianas

- b) reduz drasticamente as células CD4 no granuloma das formas dimorfas
- c) é freqüente na África
- d) reduz as células CD4 no sangue periférico
- e) produz todos os fatos acima

60. Os antígenos mais comumente encontrados na dermatite de contato por sensibilização à borracha pertencem ao grupo:

- a) carba
- b) mercapto
- c) PPD
- d) tiuram
- e) parabens

61. Qual dos achados é menos provável de ser encontrado em casos iniciais de hanseníase virchowiana:

- a) hipoestesia de extremidades
- b) mal perfurante plantar
- c) máculas eritematosas roseoliformes
- d) manchas hipocrômicas
- e) obstrução nasal com secreção sanguinolenta

62. A erupção polimorfa à luz pode ser tratada com:

- a) indometacina
- b) psoraleno mais UVA
- c) pentoxifilina
- d) bloqueadores de H2
- e) isotretinoína

63. Na Telangiectasia Hemorrágica Hereditária (Doença de Rendu-Osler-Weber), as hemorragias provém de:

- a) Calcificação da íntima dos vasos
- b) Diminuição da luz vascular

- c) Ruptura de telangiectasias
- d) Plaquetopenia
- e) Diminuição do fibrinogênio

64. A escarlatina possui as seguintes características, exceto:

- a) incubação de 10 a 18 dias
- b) erupção iniciando pelo tronco e terminando pelas pernas
- c) descamação lamelar abundante de palmas e plantas, depois do eritema
- d) linhas de Pastia por fragilidade capilar
- e) miocardite nas formas graves

65. A goma ocorre nas doenças abaixo, excetuando-se:

- a) sífilis
- b) esporotricose
- c) micetoma
- d) hanseníase
- e) tuberculose

66. Raio X revelando estriações verticais e paralelas nas metáfises dos ossos longos (osteopatia estriada) é uma característica de:

- a) Marfan
- b) Ainhum
- c) Aplasia Cútis Congênita
- d) Hipoplasia Dérmica Focal
- e) Lipodistrofia

67. Solução de continuidade dermoepidérmica que ocorre mais freqüentemente ao redor dos orifícios naturais:

- a) esfacelo
- b) flictena
- c) ponfo
- d) tubérculo



e) rágade

68. O eritema nodoso, na sarcoidose, acompanha:

- a) a fase inicial da doença
- b) o lúpus pérnio
- c) as formas eritrodérmicas
- d) as formas anulares
- e) qualquer estágio granulomatoso da doença

69. A acantose nigricans maligna está associada principalmente com qual tumor maligno

- a) melanoma
- b) sarcoma de Kaposi
- c) adenocarcinoma
- d) melanoma maligno
- e) osteosarcoma

70. A unha com depressões puntiformes também chamada de unha em dedal e observada freqüentemente na psoríase, pode ser vista também:

- a) na esclerodermia
- b) no lúpus eritematoso
- c) nas dermatoses bolhosas
- d) na alopecia areata
- e) nas acrocianoses

71. A sarna crostosa ou norueguesa tem como agente etiológico:

- a) *Sarcoptes scabiei* var. *hominis*
- b) *Sarcoptes scabiei* var. *canis*
- c) *Tunga penetrans*
- d) *Onchocerca volvulus*
- e) *Dermatobia hominis*

72. A Púrpura que pode estar acompanhada de febre, artralgias, dores abdominais e melena é a:

- a) Púrpura Eczematóide
- b) Púrpura de Willerbrand
- c) Púrpura trombocitopênica idiopática
- d) Púrpura de Henoch-Schönlein
- e) Púrpura do Síndrome de Marfan

73. O aciclovir, droga antiviral e análogo da guanosina, é tratamento de escolha em qual infecção:

- a) epidermodisplasia verruciforme
- b) exantema infeccioso
- c) primo infecção herpética
- d) rubéola
- e) verrugas

74. Um teste sorológico não-treponêmico falso-positivo crônico, não pode ser:

- a) familiar
- b) ligado à tireoidite de Hashimoto
- c) causado por cirrose
- d) provocado por granulomatose de Wegener
- e) ligado a neoplasias malignas

75. O tratamento de escolha para o epitelioma basocelular esclerodermiforme é:

- a) neve carbônica
- b) nitrogênio líquido
- c) 5-fluoruracil
- d) quimioterapia de Mohs
- e) ácido tricloroacético

76. O granuloma anular disseminado pode estar associado a:

- a) Diabete mérito

- b) SIDA
- c) maior incidência de antígeno HLA Cw6
- d) todos acima
- e) somente a e b

77. A cromoblastomicose pode ser causada pelos seguintes fungos, exceto:

- a) *Cladosporium carrionii*
- b) *Wangiella dermatitidis*
- c) *Trichosporon beigelli*
- d) *Fonsecaea pedrosoi*
- e) b e c

78. No eflúvio telógeno, os pêlos em queda podem ficar retidos nos folículos antes de caírem até o prazo de:

- a) 2 semanas
- b) 3 semanas
- c) 1 mês
- d) 2 meses
- e) 3 meses

79. As células de Langerhans representam:

- a) migração epidérmica de células encontradas nos granulomas
- b) migração intraepidérmica de pequenos linfócitos imunocompetentes
- c) provável macrófago importante no reconhecimento antigênico
- d) imagem artificial obtida na impregnação argêntica
- e) gigantócitos

80. Na Urticária por drogas, o diagnóstico etiológico no nosso meio fará por:

- a) Anamnese cuidadosa
- b) Teste de imunodifusão em agar
- c) Teste de linfócitos in vitro

- d) RAST
- e) Soroaglutinação

81. Na doença de Kyrle, o fenômeno patogênico primordial é:

- a) perfuração
- b) disceratose
- c) colagenólise
- d) vesiculação
- e) necrose

82. O *Trichophyton rubrum*:

- a) não acomete as unhas
- b) é uma espécie geofílica
- c) pode acometer difusamente a região plantar, com escamas
- d) produz bolhas, quando associado a *Acinetobacter* sp.
- e) dificilmente causa intertrigo

83. As fotodermatoses em grande parte são causadas pela luz compreendida entre:

- a) 200 e 290 nm
- b) 290 e 320 nm
- c) 320 e 400 nm
- d) 240 e 400 nm
- e) acima de 400 nm

84. O quadro histológico das anetodermias eritematosas inicialmente caracteriza-se por:

- a) Processo inflamatório perivascular com eosinófilos
- b) Processo inflamatório perivascular de moderado a intenso, constituído por linfócitos e histiócitos
- c) Processo inflamatório perivascular moderado sem linfócitos e histiócitos
- d) Processo raramente perivascular com eosinófilos
- e) Processo inflamatório granulomatoso

85. Com relação a acne vulgar, assinale a afirmativa correta:

- a) nos rapazes afeta principalmente o tronco, enquanto nas moças afeta mais intensamente a face
- b) nem sempre a seborréia está presente
- c) os comedões são mais freqüentes nos indivíduos com mais idade
- d) afeta principalmente a face, seguida do dorso, e região anterior do tronco
- e) afeta principalmente a face, seguida da região anterior do tronco, e dorso

86. A Dermatite Seborréica pode estar presente por estímulos das glândulas sebáceas, em uma destas afecções:

- a) Doença de Parkinson
- b) Insuficiência Renal Crônica
- c) Doença de Basedow
- d) Macroglobulinemia
- e) Hirsutismo

87. Das substâncias relacionadas abaixo, qual não é fotossensível:

- a) derivados sulfamídicos
- b) fenotiazínicos
- c) griseofulvina
- d) cloroquina
- e) clotrimazol

88. As lesões tumorais malignas mais comumente observadas nas áreas de radiodermite são:

- a) carcinomas
- b) melanomas
- c) miosarcomas
- d) angiolinfosarcoma
- e) lentigo maligno

89. Na síndrome de Netherton (pêlo em bambu) assinale o certo:

- a) há associação a transtornos neurológicos
- b) ocorre junto com a dermatite atópica
- c) ocorre mais no sexo masculino
- d) afeta os pêlos e as unhas
- e) ocorre associada a ictiose

90. No tratamento da Helmintíase migrante, a droga de escolha é:

- a) griseofulvina
- b) metronidazol
- c) dietilcarbamazina
- d) thiabendazol
- e) sulfas

91. No Líquen Plano Actínico, o grupo etário mais atingido é o de:

- a) Adultos
- b) Idosos
- c) Adultos jovens e crianças
- d) Mulheres idosas
- e) Idosos e crianças

92. Os quelóides pós-cirúrgicos freqüentemente têm sua origem por:

- a) Ferida muito profunda
- b) Rejeição de fios inabsorvíveis
- c) Retirada precoce de pontos
- d) Pontos muito tensos
- e) Irritação pelo merthiolate

93. A leishmaniose tegumentar americana, que se caracteriza por uma ulceração com borda em moldura, não tem como diagnóstico diferencial:

- a) esporotricose
- b) paracoccidiodomicose

- c) tuberculose
- d) amiloidose maculosa
- e) cromomicose

94. O espessamento neural na hanseníase deve ser diferenciado de:

- a) doença de Déjérine-Sottas
- b) amiloidose sistêmica
- c) diabetes insulino-resistente
- d) todos acima
- e) a e b

95. A mastocitose com prurido sem hipotensão e eritema deve ser medicada com:

- a) hidroxizina e aspirina
- b) bloqueadores de H1
- c) bloqueadores de H2
- d) corticosteróides tópicos
- e) PUVA

96. No Síndrome de Wiskott-Aldrich, a doença é hereditária:

- a) Recessiva ligada ao cromossomo X
- b) Recessiva ligada ao cromossomo Y
- c) Dominante ligada ao cromossomo X
- d) Dominante ligada ao cromossomo Y
- e) Recessiva de penetrância diminuída

97. Assinale a alternativa incorreta:

- a) o epithelioma cuniculatum ocorre nas plantas
- b) a úlcera de Marjolin pode ocorrer em cicatrizes de queimaduras ou de úlceras
- c) usualmente os carcinomas basocelulares metastáticos são metatípicos
- d) os carcinomas espinocelulares de áreas expostas sempre apresentam menor potencial de malignidade

e) pérolas córneas são sinais de maior diferenciação do carcinoma espinocelular

98. O Líquen Escleroso e Atrófico, quando localizado em genitália feminina, é o correspondente da:

a) Esclerose Tuberosa

b) Leucoplasia

c) Craurose vulvar

d) Esclerodermia

e) Atrofia branca de Millian

99. Com relação às afirmativas abaixo, assinale o correto:

1 - há sempre uma alteração hormonal androgênica nas mulheres portadoras de acne vulgar.

2 - existe uma correlação entre hirsutismo e a intensidade da acne vulgar.

3 - não existe uma correlação entre a intensidade da acne vulgar e irregularidades no ciclo menstrual.

a) 1ª afirmativa

b) 2ª afirmativa

c) 3ª afirmativa

d) todas as afirmativas

e) nenhuma afirmativa

100. No herpes simples recidivante, qual dos itens abaixo relacionados não participa dos fatores desencadeantes:

a) exposição solar prolongada

b) estresse emocional

c) tratamento com drogas imunossupressoras

d) linfomas

e) hialinose cutânea e mucosa