



SOCIEDADE BRASILEIRA  
DE DERMATOLOGIA  
Afilhada à Associação Médica Brasileira  
www.sbd.org.br

# 53º EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA

## LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

1. Este caderno contém as questões da **PROVA TEÓRICA**.
2. Ao receber a **Folha de Respostas**,
  - confira seu nome e número de inscrição;
  - assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.
3. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:  

**“Do amor pouco sei, e quase tudo espero.”** Cazuya

### ATENÇÃO:

**FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

4. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

	A	B	C	D	
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• assinale somente <b>uma</b> alternativa em cada questão.
					• Sua resposta <b>NÃO</b> será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

### NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** da **PROVA TEÓRICA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**ATENÇÃO:** Durante o período de realização das Provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. Não será permitido nenhum tipo de consulta a livros, periódicos, compêndios, revistas, impressos, manuais, códigos, anotações ou a qualquer outro material. É proibido, durante a realização das Provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, bipe, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo, e utilizar de qualquer recurso audiovisual próprio, podendo a organização do Exame vetar a utilização pelo candidato de outros aparelhos além dos anteriormente citados. Terá a sua Prova anulada e será eliminado do Exame o candidato que incorrer nas seguintes situações: portar arma(s) no local da realização das provas, mesmo de posse do respectivo porte; deixar de atender as normas contidas nas provas e as demais orientações expedidas pela FUNDEP; faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da Prova, com autoridades presentes e / ou com os outros candidatos. Os candidatos somente poderão se ausentar do recinto da Prova Teórica depois de decorridas **duas horas do seu início**. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos.

## DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

O gabarito preliminar e as questões da Prova Teórica serão divulgados a partir do dia 19 de março de 2019 no endereço eletrônico <[www.gestaodeconcursos.com.br](http://www.gestaodeconcursos.com.br)>.

# ATENÇÃO

Senhor(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **80 (oitenta) questões objetivas** envolvendo conhecimentos de **Dermatologia Clínica, Laboratorial, Cirúrgica e Cosmiátrica**, cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas**, das quais apenas **uma** responde corretamente ao que é solicitado.

Havendo algum problema, informe-o **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, **não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.**

### QUESTÃO 1

Em relação às lesões císticas, assinale a alternativa correta.

- A) Os hidrocistomas podem ser hereditários com caráter autossômico dominante, devido a mutações no gen KRT17.
- B) Os cistos *velus* eruptivos podem ocorrer em associação com o esteatocistoma múltiplo.
- C) Os cistos triquilemais proliferativos ocorrem mais frequentemente em homens e são localizados no dorso.
- D) Indivíduos portadores da síndrome de Gardner apresentam como uma de suas manifestações clínicas múltiplos esteatocistomas.

### QUESTÃO 2

Considerando o mapeamento corporal total (fotografia corporal total associada à dermatoscopia digital) para o acompanhamento de lesões melanocíticas suspeitas de melanoma, pode-se afirmar que

- A) não é indicativo de biópsia, no seguimento de curto prazo (três meses), o surgimento de pontos pretos.
- B) esse mapeamento não reduz o número de biópsias desnecessárias.
- C) esse mapeamento não é indicado para todos os pacientes com história prévia de melanoma.
- D) esse mapeamento não deve ser aplicado para o seguimento de lesões melanocíticas suspeitas palpáveis.

### QUESTÃO 3

Em relação aos marcadores imuno-histoquímicos utilizados em Dermatologia, assinale a alternativa correta.

- A) O SOX10 apresenta alta sensibilidade para o diagnóstico do melanoma cutâneo primário e metastático.
- B) O EMA é marcador mais específico para o diagnóstico de carcinoma de Merkel.
- C) O fator XIIIa é utilizado para o diagnóstico específico da mastocitose.
- D) Com o marcador Ki-67, é possível fazer a distinção entre os diagnósticos de carcinoma basocelular e espinocelular.

### QUESTÃO 4

Em relação às metástases cutâneas, assinale a alternativa correta.

- A) O câncer de próstata é o que mais frequentemente apresenta metástase cutânea em homens.
- B) O rabdomiossarcoma, a leucemia e o neuroblastoma estão relacionados com a maior parte dos casos dessas metástases em crianças.
- C) A presença de corpos psammoma na histopatologia indica a origem pulmonar do sítio primário.
- D) O carcinoma telangiectásico representa uma forma clínica de metástase cutânea relacionada com o câncer de pulmão.

### QUESTÃO 5

Sobre o nevo melanocítico recorrente, assinale a alternativa correta.

- A) Surge após 12 meses da excisão incompleta.
- B) Demonstra um maior risco de evoluir para melanoma.
- C) Manifesta achados dermatoscópicos sugestivos de melanoma.
- D) Apresenta pigmentação que transgride os limites da cicatriz.

### QUESTÃO 6

Em relação às dermatoses associadas a neoplasias internas, assinale a alternativa correta.

- A) O *erythema gyratum repens* é caracterizado pela ocorrência súbita de eritema na cabeça e no pescoço e apresenta alterações pelagroides e esclerodermoides em estágios avançados.
- B) A acroceratose paraneoplásica caracteriza-se pelo surgimento lento e gradual de pápulas ceratósicas nas bordas das palmas e plantas de coloração amarelo-acastanhada.
- C) A crioglobulinemia tipo I caracteriza-se pela presença de púrpura retiforme e necrose que ocorrem preferencialmente nas áreas frias da região acral, cianose acral e livedo reticular.
- D) O angioedema adquirido devido à deficiência do inibidor da C1 esterase, em geral, é acompanhado por perda de peso e está mais frequentemente associado ao adenocarcinoma de estômago.

### QUESTÃO 7

Em relação à imunofenotipagem, assinale a dermatose que não apresenta marcação com CD30+.

- A) Linfoma anaplásico de grandes células.
- B) Papulose linfomatoide.
- C) Linfoma B da zona marginal.
- D) Reação à picada de artrópodes.

### QUESTÃO 8

Em relação ao melanoma, assinale a alternativa que apresenta o principal fator prognóstico.

- A) Sítio anatômico.
- B) Presença de infiltrado inflamatório.
- C) Presença de mitoses na derme.
- D) Espessura tumoral.

### QUESTÃO 9

Sobre os tumores anexiais cutâneos, assinale a alternativa correta.

- A) A neoplasia secundária mais comumente associada ao nevo sebáceo é o siringocistoadenoma papilífero.
- B) A esclerose tuberosa é caracterizada pela ocorrência de tricoepiteliomas múltiplos na porção central da face.
- C) A localização anatômica mais frequente do carcinoma anexial microcístico é a região frontal.
- D) A presença de múltiplos triquilemomas deve levantar suspeita de síndrome de Cowden.

### QUESTÃO 10

Em relação aos tumores cutâneos, assinale a alternativa correta.

- A) O nevo epidérmico verrucoso inflamatório linear (NEVIL) é duas vezes mais frequente em homens do que em mulheres.
- B) O acantoma de células claras tem origem em células pluripotentes da camada basal da epiderme e está relacionado com mutações nos genes KRT1 ou KRT10.
- C) O lentigo solar resulta de uma hiperplasia da epiderme com graus variados de proliferação melanocítica e acúmulo de melanina nos queratinócitos.
- D) O nevo comedoniano é um hamartoma que geralmente surge após os 20 anos de idade e localiza-se mais frequentemente nos membros inferiores.

### QUESTÃO 11

Em relação à dermatoscopia, a rede negativa ou a rede invertida é mais frequentemente observada em:

- A) Carcinoma basocelular.
- B) Nevo de Spitz.
- C) Ceratose seborreica.
- D) Doença de Bowen.

### QUESTÃO 12

Em relação às porfirias, assinale a alternativa incorreta.

- A) Na aguda intermitente, de herança autossômica recessiva, o excesso de porfobilinogênio deaminase (PBGD) explica a diminuição da excreção de ácido delta-aminolevulínico e de porfobilinogênio na urina desses doentes.
- B) A aguda intermitente caracteriza-se por dor abdominal, sintomas neurológicos e psiquiátricos, além de hiponatremia. Não apresenta lesões cutâneas.
- C) Na variegata, os ataques agudos caracterizam-se por dor abdominal intensa, taquicardia, fraqueza muscular simétrica e sintomas neurológicos.
- D) A cutânea tardia tipo I ou esporádica tem como fatores desencadeantes o álcool, os estrógenos, as infecções virais e a insuficiência renal crônica em pacientes submetidos à hemodiálise.

### QUESTÃO 13

Em relação à sífilis, assinale a alternativa correta.

- A) A sífilis maligna precoce corresponde às manifestações cutâneas da sífilis tardia e surge, em média, dois a sete anos após o secundarismo.
- B) A antigenemia prolongada favorece a formação de imunocomplexos que podem produzir síndrome nefrótica.
- C) No cancro misto de Rollet, o protossifiloma manifesta-se em primeiro lugar.
- D) O cancro duro, na amígdala, manifesta-se como amigdalite bilateral e de consistência frouxa e amolecida.

#### QUESTÃO 14

Em relação às púrpuras, assinale a alternativa correta.

- A) A púrpura no período neonatal pode ser desencadeada por eritropoiese extramedular, deficiência das proteínas C e S, septicemia e síndrome de Wiskott-Aldrich.
- B) A doença de Schamberg acomete predominantemente o sexo feminino, e as lesões restringem-se ao terço inferior das pernas, estando relacionada, principalmente, à insuficiência venosa crônica.
- C) A púrpura eczematoide de Doucas-Kapetanakis ocorre predominantemente em indivíduos acima dos 50 anos de idade, com lesões surgindo inicialmente em pescoço e tórax com progressão craniocaudal, sendo característica a ausência de prurido.
- D) A púrpura anular de Majocchi ocorre predominantemente em mulheres menopausadas, acomete qualquer área corpórea e pode estar associada a hipertensão arterial sistêmica, porfiria cutânea tardia e doença de Hodgkin.

#### QUESTÃO 15

Em relação às vasculites, assinale a alternativa correta.

- A) A vasculite crioglobulinêmica pode ser atribuída à infecção pelo vírus da hepatite C, lúpus eritematoso, dermatopolimiosite, artrite reumatoide e linfomas.
- B) Na poliarterite nodosa clássica, os acometimentos renal e hepático são discretos ou ausentes e, quando ocorrem, caracterizam-se por áreas atróficas decorrentes da vasoconstrição de vasos de pequeno calibre e arteríolas, com depósito de imunocomplexos nas suas paredes.
- C) A síndrome de Churg-Strauss é uma vasculite leucocitoclástica que apresenta uma inflamação granulomatosa rica em neutrófilos e plasmócitos, envolvendo trato respiratório em pacientes jovens.
- D) Os anticorpos anticitoplasma de neutrófilos C (c-ANCA) têm como antígeno-alvo a mieloperoxidase e a elastase, enquanto os anticorpos anticitoplasma de neutrófilos P (p-ANCA) têm como antígeno-alvo a proteinase 3.

#### QUESTÃO 16

Em relação às afecções das mucosas, assinale a alternativa incorreta.

- A) A língua geográfica, na sua fase ativa, apresenta áreas eritematosas nas quais as papilas fungiformes são proeminentes, enquanto as papilas filiformes dificilmente são vistas.
- B) A língua fissurada, representada por numerosos pequenos sulcos na sua superfície dorsal e geralmente assintomática, pode ser encontrada em pacientes com psoríase, deficiência de niacina, sífilis, síndrome de Down e febre tifoide.
- C) A hiperplasia epitelial focal está associada aos HPV 16 e 18 com lesões localizadas, principalmente, nas mucosas jugal e labial, ocorrendo em adultos jovens, e apresenta risco de recidiva e malignização.
- D) A candidíase leucoplásica se apresenta com placas brancas, bem demarcadas, que não são removidas pela raspagem e acometem, principalmente, a mucosa jugal com risco de transformação maligna.

#### QUESTÃO 17

Em relação às lesões granulomatosas, assinale a alternativa correta.

- A) O substrato anatomopatológico do granuloma anular, na forma intersticial, revela histiócitos epitelioides entre os feixes de colágeno separados por mucina e linfócitos ao redor de vasos na derme superficial e na profunda.
- B) O substrato anatomopatológico do granuloma anular, na forma granulomatosa necrobiótica, revela dermatite granulomatosa com linfócitos dispostos em paliçada ao redor de áreas de necrose de colágeno, ausência ou pouca quantidade de mucina e grande quantidade de plasmócitos. Esses achados ajudam a diferenciar o granuloma anular da sarcoidose.
- C) O substrato anatomopatológico da necrobiose lipoídica nas lesões recentes revela infiltrado inflamatório perivascular superficial e profundo rico em plasmócitos e macrófagos. Além disso, há vasculite leucocitoclástica e granulomatosa responsável pela necrose de anexos.
- D) O substrato anatomopatológico da sarcoidose está representado pelo granuloma eosinofílico caseoso, envolto por espesso infiltrado linfocitário no órgão acometido, com focos de vasculite de pequenos vasos.

### QUESTÃO 18

Em relação à sífilis, assinale a alternativa correta.

- A) O rápido estabelecimento da imunidade celular explica o curso curto da doença, com evolução final para cura.
- B) Histologicamente, a sífilis maligna precoce caracteriza-se por uma vasculite leucocitoclástica de vasos de pequeno calibre.
- C) Meningiomielite com dores, parestesias e paraparesia espástica são características da neurosífilis medular.
- D) As lesões mucosas da sífilis secundária não são contagiantes e, quando acometem a laringe, podem levar à rouquidão.

### QUESTÃO 19

Em relação às dermatoviroses, assinale a alternativa correta.

- A) A *roseola infantum*, causada pelo herpes vírus tipo 9, caracteriza-se inicialmente por erupção exantemática pruriginosa no tronco, seguida por febre baixa que regride em dez dias.
- B) O herpes vírus tipo 3 é vírus oncogênico e está associado ao carcinoma da nasofaringe, linfoma de Burkitt e doença linfoproliferativa após transplante de órgãos sólidos.
- C) A acrodermatite papulosa infantil, causada pelo herpes vírus tipo 4, caracteriza-se por período prodromico de febre e coriza, seguido de erupção cutânea simétrica na face, membros e região glútea.
- D) O tumor de Buschke-Lowenstein é causado pelos genótipos de HPV 16 e 18, de alto poder oncogênico, sendo frequente a evolução do condiloma acuminado para essa doença.

### QUESTÃO 20

Em relação à foliculite pustulosa eosinofílica associada à imunossupressão pelo HIV, assinale a alternativa correta.

- A) Caracteriza-se por pápulas foliculares, eritematosas e urticariformes.
- B) As lesões causadas pela doença são assintomáticas.
- C) Os achados do exame histopatológico são diferentes dos da doença de Ofuji.
- D) A doença não responde ao tratamento com fototerapia UVB.

### QUESTÃO 21

Em relação às mordidas humanas, assinale a alternativa incorreta.

- A) Podem ser responsáveis pela transmissão dos herpes vírus tipos 1 e 2.
- B) Podem representar um possível modo de transmissão do HIV.
- C) Podem ser responsáveis pela transmissão de hepatite A.
- D) Podem produzir feridas nas quais *Eikenella corrodens* pode ser isolada.

### QUESTÃO 22

São manifestações clínicas do piebaldismo, exceto:

- A) Acromia triangular da região frontal.
- B) Múltiplas manchas café com leite.
- C) Hamartomas pigmentares da íris.
- D) Poliose.

### QUESTÃO 23

Em relação ao tratamento tópico do melasma, assinale a alternativa incorreta.

- A) O ácido azelaico é um inibidor competitivo da tirosinase.
- B) A tretinoína não é capaz de inibir a melanogênese.
- C) O ácido kójico é um derivado fúngico conhecido por inibir a tirosinase.
- D) A hidroquinona é capaz de danificar os melanócitos.

### QUESTÃO 24

Em relação à terapia fotodinâmica com luz visível do dia (*daylight*-TFD), assinale a alternativa correta.

- A) É necessária a oclusão da área a ser tratada após aplicação do fotossensibilizante.
- B) O nível de dor nessa terapia é semelhante ao da terapia fotodinâmica convencional.
- C) É recomendada a aplicação de filtro solar orgânico antes da sessão.
- D) O tempo de exposição à luz é igual ao do método convencional.

### QUESTÃO 25

Em relação a *lasers* em tratamentos dermatológicos, assinale a alternativa correta.

- A) Os principais picos de absorção da oxi-hemoglobina são 418, 542 e 577nm.
- B) Os *lasers* de QS-Nd:YAG apresentam duração de pulso em milissegundos.
- C) O *laser* de Túlio de 1.927 nm apresenta uma penetração na pele em torno de 1.500 micrômetros.
- D) O *laser* de Er:YAG de 2.940 nm apresenta um coeficiente de absorção pela água menor que o *laser* de CO<sub>2</sub> de 10.600 nm.

### QUESTÃO 26

Em relação à criocirurgia com nitrogênio líquido, assinale a alternativa correta.

- A) O nitrogênio líquido apresenta ponto de ebulição a -100 °C.
- B) A técnica fechada ou de contato é indicada para o tratamento de lesões vasculares.
- C) A criocirurgia de tumores malignos consiste em um único ciclo de congelamento e descongelamento.
- D) Os melanócitos são muito resistentes ao frio e à criocirurgia.

### QUESTÃO 27

Em relação à eletrocirurgia, assinale a alternativa correta.

- A) Para a limpeza da pele antes desse procedimento, recomenda-se a utilização de soluções alcoólicas de cloro-hexidina ou iodopovidina.
- B) Eletrodissecção é uma ablação superficial da pele, utilizando-se um equipamento monoterminal.
- C) Na eletrocoagulação, a corrente elétrica é de alta voltagem e baixa amperagem, se comparada à da eletrodissecção.
- D) Na eletrocirurgia de alta frequência, o eletrodo é quente e não precisa ser esterilizado.

### QUESTÃO 28

Em relação às complicações relacionadas aos preenchedores de ácido hialurônico, são indicações para o uso de hialuronidase, exceto:

- A) Efeito Tyndall.
- B) Reações localizadas de hipersensibilidade.
- C) Comprometimento vascular.
- D) Nódulos eritematosos infecciosos.

### QUESTÃO 29

São possíveis efeitos adversos do uso estético da toxina botulínica tipo A, exceto:

- A) Disartria.
- B) Salivação.
- C) Sintomas gripais.
- D) Reações de hipersensibilidade.

### QUESTÃO 30

Em relação aos *peelings* químicos, assinale a alternativa incorreta.

- A) O de ácido salicílico apresenta ação anti-inflamatória.
- B) Os alfa-hidroxiácidos em baixas concentrações provocam epidermólise.
- C) O ácido tricloroacético provoca coagulação de proteínas na pele.
- D) A resorcina apresenta efeito despigmentante.

### QUESTÃO 31

Com relação às variantes pustulosas da psoríase, assinale a alternativa correta.

- A) As formas generalizadas são desencadeadas por interrupção de corticoterapia sistêmica, hipocalcemia, diminuição da vitamina D, gravidez, fatores irritantes locais, fármacos bloqueadores do canal de cálcio e infecções.
- B) O comprometimento do estado geral, a febre elevada e a leucocitose são mais comumente vistos na forma localizada pustulosa palmoplantar e na acrodermatite de Hallopeau.
- C) A forma pustulosa palmoplantar é desencadeada pelo estresse emocional e por infecções e é agravada pelo tabagismo, sendo também associada à síndrome SAPHO.
- D) A forma generalizada de Von Zumbusch, psoríase da matriz ungueal e couro cabeludo são importantes marcadores de predisposição à artrite psoriática.

### QUESTÃO 32

Com relação às características clínicas das úlceras de membros inferiores, assinale a alternativa correta.

- A) Úlcera venosa: localização maleolar medial, palidez e dor quando da elevação da perna, além de varicosidades.
- B) Úlcera arterial: localização em pontos distais e sítios de pressão, membro afetado com rubor na elevação e palidez quando pendente, pele atrófica com perda de pelos e pulsos periféricos fracos ou ausentes.
- C) Úlcera venosa: localização maleolar medial bem demarcada “em saca-bocado” e pulsos pediosos impalpáveis.
- D) Úlcera neuropática: neuropatia periférica com sensibilidade diminuída, localização em sítios de pressão “em saca-bocado” e presença de calos espessos.

### QUESTÃO 33

Considerando a epidemiologia e a clínica da sarcoidose, assinale a alternativa correta.

- A) A distribuição etária segue um padrão bimodal, com picos entre 10 e 20 anos e entre 35 e 45 anos.
- B) As lesões podem ocorrer em cicatrizes curadas preexistentes ou em locais de traumas, sendo as manifestações cutâneas mais comuns o eritema multiforme e as placas verrucosas.
- C) A associação de quadro febril, artrite, comprometimento de parótidas e glândulas salivares constitui a síndrome de Heerfordt, mais comum em homens jovens.
- D) A manifestação sistêmica mais comum é pulmonar, com estágio final de fibrose e bronquiectasia. Outras manifestações comuns são osteoarticulares, oculares, neurológicas e cardíacas.

### QUESTÃO 34

Com relação ao prurigo actínico, assinale a alternativa incorreta.

- A) Há indícios de ser determinado por fatores genéticos, com forte associação com o HLA-DR4 (DRB1\*0401 e DRB1\*0407).
- B) A histopatologia, em alguns casos, simula linfoma cutâneo.
- C) Pode representar uma variante persistente da erupção polimorfa à luz.
- D) A ciclosporina é o tratamento farmacológico de escolha, sendo formalmente contraindicada a fototerapia.

### QUESTÃO 35

Com relação às variedades histoide e difusa de Lucio da hanseníase, assinale a alternativa correta.

- A) A variedade histoide ocorre com maior frequência nos casos de sulfonorresistência, mas pode também ocorrer em casos virgens de tratamento das formas virchowiana, *borderline virchowiana* e *borderline borderline*.
- B) Na variedade histoide, o quadro histopatológico apresenta infiltrado exuberante de histiócitos fusiformes, repletos de bacilos e com pouca vacuolização.
- C) Na variedade difusa de Lucio, são característicos os nódulos ulcerados ricos em bacilos, bem como a prova da histamina completa no restante do tegumento.
- D) A variedade difusa de Lucio, também chamada de hanseníase “bonita”, é restrita ao México, não tendo relação com o fenômeno de Lucio, o qual é uma vasculite leucocitoclástica de pequenos e médios vasos com áreas necróticas e ulcerativas.

### QUESTÃO 36

Com relação às formas clínicas da tuberculose cutânea, assinale a alternativa correta.

- A) A tuberculose verrucosa acomete mais comumente mãos e antebraços, cursa com envolvimento ganglionar e apresenta PPD geralmente negativo.
- B) O cancro tuberculoso caracteriza-se por pequena pápula ou úlcera indolor de difícil cicatrização, acometendo indivíduos previamente infectados pelo bacilo.
- C) O escrofuloderma começa com nódulo firme e aderente à pele, evoluindo para flutuação, supuração e fistulização, tendo como foco original, geralmente, um linfonodo ou osso subjacente.
- D) No lupo vulgar, a lesão típica é composta por pápulas ou placa, de coloração marrom-avermelhada, com aspecto de “geleia de maçã” à vitropressão, acometendo indivíduos não previamente infectados pelo bacilo.



### QUESTÃO 37

Relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando as formas clínicas da hanseníase às suas respectivas lesões.

#### COLUNA I

1. Hanseníase indeterminada
2. Hanseníase tuberculoide
3. Hanseníase *borderline borderline*
4. Hanseníase virchowiana

#### COLUNA II

- ( ) Lesões em placas ou anulares com bordas papulosas, eritematosas ou hipocrômicas.
- ( ) Máculas hipocrômicas, com diminuição da sudorese e alteração da sensibilidade térmica variável.
- ( ) Pápulas, nódulos e infiltrações difusas com distribuição simétrica.
- ( ) Placas e lesões foveolares com distribuição assimétrica.

Assinale a sequência correta.

- A) 1 2 3 4
- B) 2 1 4 3
- C) 2 3 4 1
- D) 4 3 1 2

### QUESTÃO 38

Com relação à doença de Lyme, assinale a alternativa incorreta.

- A) É causada por genoespécies diferentes da espiroqueta *Borrelia burgdorferi*, tendo como vetores diversas espécies de carrapatos *Ixodes*.
- B) O nome da doença deve-se a uma forma epidêmica de eritema migratório, precedido por artrite, encontrado em idosos nas redondezas de Lyme, Connecticut.
- C) Apresenta três fases clínicas: doença recente localizada, doença recente disseminada e doença crônica, sendo o eritema migratório critério clínico importante na doença recente.
- D) Além das manifestações dermatológicas, o manejo da doença impõe, principalmente, a pesquisa de manifestações neurológicas, cardíacas, oftalmológicas e musculoesqueléticas.

### QUESTÃO 39

Em relação à etiologia e ao diagnóstico dos micetomas, assinale a alternativa correta.

- A) Os actinomicetomas são causados por bactérias aeróbicas, principalmente pela *Nocardia brasiliensis* e *Actinomyces israelii*.
- B) Os actinomicetomas localizam-se principalmente nos pés e, quando causados pela *Nocardia brasiliensis*, excretam grãos de cor rosa a vermelha.
- C) Quando um micetoma excreta um grão de cor preta, direciona-se o diagnóstico para actinomicetoma, pois os eumicetomas não produzem grãos dessa cor.
- D) Os eumicetomas são causados por fungos verdadeiros, acometendo, sobretudo, as extremidades inferiores, assim como outros locais, como a cavidade oral.

### QUESTÃO 40

Sobre o líquen estriado, assinale a alternativa incorreta.

- A) Sua ocorrência é mais comum em crianças e mulheres.
- B) Na maioria dos casos, surge como uma manifestação unilateral, acometendo uma extremidade.
- C) Na histopatologia, encontram-se acantose, espongirose e queratinócitos disqueratóticos que podem estar presentes nas camadas córnea e granulosa e na junção dermoepidérmica.
- D) As lesões devem ser tratadas com corticoide oral, uma vez que não regredem espontaneamente.

### QUESTÃO 41

Analise o caso clínico a seguir.

Considere um paciente, sexo masculino, 40 anos de idade, trabalhador na extração do látex no estado do Amazonas, com lesão ulcerada, circular, de fundo vermelho e borda elevada, localizada no membro inferior direito, em evolução há oito meses. Considerando a mais provável hipótese diagnóstica, de acordo com os critérios clinicoepidemiológicos, assinale a alternativa que contempla os dois exames complementares mais adequados para a elucidação diagnóstica.

- A) Pesquisa direta para leishmania e cultura em ágar batata.
- B) Intradermoreação de Montenegro e histopatológico.
- C) Cultura para fungos e histopatológico.
- D) Intradermoreação de Frei e histopatológico.

### QUESTÃO 42

Em relação à pitíriase liquenoide varioliforme aguda (PLEVA) e à pitíriase liquenoide crônica (PLC), assinale a alternativa correta.

- A) Na PLEVA, predomina infiltrado de células T CD4+, e na PLC predomina infiltrado de células T CD8+.
- B) A transição da PLEVA para a doença de Mucha-Habermann ulcerativa febril, a qual pode cursar com febre, mialgia, sintomas neurológicos, gastrointestinais e pulmonares, é associada ao aumento dos níveis séricos de TNF-alfa.
- C) Na PLC, a histopatologia pode exibir eritrócitos extravasados, queratinócitos apoptóticos, bem como dermatite perivascular superficial de interface.
- D) Na PLC, os principais diagnósticos diferenciais são reação à picada de inseto, varicela, dermatite herpetiforme e vasculite cutânea de pequenos vasos.

### QUESTÃO 43

Em pacientes com alopecia areata, encontram-se as seguintes alterações ungueais, exceto:

- A) Lúnulas estriadas.
- B) *Pitting* geométrico.
- C) Pterígio.
- D) Traquioníquia.

### QUESTÃO 44

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo masculino, 58 anos de idade, apresenta uma placa eritematosa e brilhante na glândula, assintomática, há mais de um ano. Foi submetido a biópsia, cujo exame histopatológico apresentou epiderme com paraqueratose e acantose, queratinócitos atípicos e pleomórficos em todas as camadas do epitélio malpighiano.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto.

- A) Balanite xerótica obliterante.
- B) Líquen esclero-atrófico.
- C) Eritroplasia de Queyrat.
- D) Balanite plasmocitária de Zoom.

### QUESTÃO 45

Em relação ao carcinoma de células de Merkel, assinale a alternativa incorreta.

- A) O *polyomavirus* é encontrado em 75 a 90% dos casos.
- B) Há alterações cromossômicas como translocação e trissomia do cromossoma 1.
- C) Em indivíduos imunossuprimidos, tende a acometer os mais jovens.
- D) A localização mais frequente é no tronco e nas extremidades.

### QUESTÃO 46

Em relação às onicopatias, assinale a alternativa incorreta.

- A) O pterígio ungueal invertido é um sinal característico da esclerodermia sistêmica.
- B) A acroqueratose paraneoplásica de Bazex é um sinal precoce de neoplasia, principalmente dos tratos respiratório e gastrointestinal.
- C) Unhas brancas de Terry encontram-se em casos de cirrose hepática.
- D) Linhas hiperocrômicas de Muehrcke são múltiplas faixas longitudinais e sinal característico de hiperalbuminemia.

### QUESTÃO 47

São importantes para o diagnóstico da tricotiodistrofia, exceto:

- A) Tricosquise.
- B) Cabelos em fita.
- C) Moniletrix.
- D) Sinal do rabo de tigre.

### QUESTÃO 48

Em relação ao ciclo do pelo no couro cabeludo, assinale a alternativa correta.

- A) Na fase anágena, a bainha radicular desaparece totalmente.
- B) A fase catágena dura cerca de duas a três semanas até que o bulbo fique totalmente ceratinizado.
- C) A fase telógena é o período em que a matriz se mantém em atividade mitótica.
- D) Na região frontal do couro cabeludo de recém-natos, há 50% de cabelos catágenos.

#### QUESTÃO 49

Em relação às dermatoses da gravidez, assinale a alternativa correta.

- A) A colestase intra-hepática da gravidez não apresenta lesões dermatológicas típicas, apenas escoriações.
- B) No impetigo herpetiforme, a ausência da pústula espongiforme de Kogoj é a principal característica do exame histopatológico.
- C) Na erupção atópica da gravidez, o prurido e as lesões eczematosas predominam nas áreas extensoras e têm início no terceiro trimestre.
- D) Na erupção polimórfica da gravidez, são característicos o prurido e as lesões em alvo na face e região periumbilical.

#### QUESTÃO 50

Em relação às síndromes genéticas, assinale a alternativa que não está relacionada ao desenvolvimento do carcinoma espinocelular (CEC).

- A) Albinismo oculocutâneo.
- B) Epidermodisplasia verruciforme.
- C) Bazex-Dupré-Christol.
- D) Ferguson-Smith.

#### QUESTÃO 51

Em relação ao melanoma cutâneo, assinale a alternativa correta.

- A) Paciente operada de melanoma invasivo deve evitar gravidez por três anos a partir da exérese do tumor, pelo risco de recidiva.
- B) O uso da terapia de reposição hormonal está relacionado com o aumento da incidência de melanoma.
- C) A pigmentação dos tecidos periungueais (sinal de Hutchinson) no melanoma ungueal é rara e representa a fase de crescimento vertical.
- D) Melanoma desmoplásico / neurotrópico é raramente amelanótico e comumente encontrado na unidade subungueal.

#### QUESTÃO 52

Assinale a alternativa que apresenta um tipo de retalho cirúrgico de rotação.

- A) Bilobado
- B) Mustardé
- C) V – Y
- D) Limberg

#### QUESTÃO 53

Em relação ao melanoma, assinale a alternativa incorreta.

- A) Para o diagnóstico histopatológico, sempre que possível, o melhor procedimento é a biópsia excisional.
- B) A biópsia incisional – remoção parcial da lesão – afeta a sobrevida e a probabilidade de metástases.
- C) O sentido da excisão elíptica nos membros deve ser longitudinal, seguindo o trajeto da drenagem linfática.
- D) A conduta cirúrgica é o tratamento de escolha para a lesão primária, e a espessura de Breslow define as margens cirúrgicas.

#### QUESTÃO 54

Em relação à terapêutica tópica, assinale a alternativa correta.

- A) Uma formulação que visa o tratamento da inflamação na dermatite atópica é composta por veículo e excipiente.
- B) Emulsificantes são bons veículos para formulações tópicas.
- C) Os vernizes são formas especiais de suspensão com duas fases voláteis.
- D) As pomadas hidrofílicas podem conter os polietilenoglicóis e são produtos umectantes removíveis com água.

### QUESTÃO 55

Em relação às interações medicamentosas, considerando um paciente que tenha indicação do uso de medicação antifúngica derivada de azóis, assinale a alternativa correta.

- A) O fenobarbital, a carbamazepina, a revirapina e a isoniazida aumentam os níveis do itraconazol.
- B) O cetoconazol diminui os níveis do indinavir.
- C) Os antifúngicos azólicos aumentam os níveis do sildefanil.
- D) Os anticoagulantes cumarínicos têm seus níveis diminuídos pelos azólicos.

### QUESTÃO 56

Assinale a alternativa que apresenta efeito colateral relacionado ao uso endovenoso da anfotericina B.

- A) Hipertricose, particularmente nas faces laterais do rosto e em áreas de pele glabra.
- B) Alterações eletrocardiográficas, principalmente em caso de interação medicamentosa.
- C) Alteração gastrointestinal do tipo obstipação.
- D) Potencial efeito de deposição pigmentar da droga na retina.

### QUESTÃO 57

Em relação à amiloidose sistêmica, assinale a alternativa correta.

- A) Os depósitos de material amiloide são comumente encontrados no cérebro.
- B) A amiloidose sistêmica primária é originada por cadeias pesadas de imunoglobulinas.
- C) Após manobra de Valsalva, surge palidez na região periorbitária.
- D) Úlceras de membros inferiores podem anteceder os sinais sistêmicos.

### QUESTÃO 58

Em relação ao queiloide, assinale a alternativa correta.

- A) Resulta de uma densidade aumentada do colágeno tipo IV.
- B) Tem ocorrência comum em crianças e idosos.
- C) Entre as citocinas com papel importante estão o TGF-beta e o VEGF.
- D) A excisão cirúrgica completa da lesão com fechamento primário apresenta bons resultados.

### QUESTÃO 59

Em relação ao escleromixedema, assinale a alternativa correta.

- A) Psicose aguda, encefalopatia e coma têm impacto relevante e estão entre as possíveis manifestações da doença.
- B) O fenômeno de Raynaud constitui um sinal do escleromixedema, que dificulta a diferenciação com as lesões da esclerodermia.
- C) A macrostomia pode ocorrer como espectro de manifestações clínicas da evolução da doença.
- D) A imunofluorescência, se positiva, demonstra IgM e, raramente, IgG depositadas na hipoderme.

### QUESTÃO 60

Em relação à fibromatose palmar, assinale a alternativa correta.

- A) Tem caráter hereditário autossômico recessivo, com penetrância variável.
- B) Associa-se com diabetes, consumo de álcool, tabagismo e infecção pelo HIV.
- C) Ocorre uma proporção aumentada de fibras colágenas, com colágeno do tipo I.
- D) Ocasionalmente, corpúsculos de Meissner estão aumentados em tamanho na histopatologia da lesão.

### QUESTÃO 61

Considere um paciente do sexo feminino, 30 anos de idade, que sofreu recentemente uma trombose venosa no membro inferior direito, após uma viagem de avião com duração de aproximadamente 8 horas. Na anamnese, informa que já sofreu dois abortos espontâneos e tem duas primas com lúpus eritematoso sistêmico.

Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- A) Pode-se encontrar, no exame físico, lesões de anetodermia e, nos exames subsidiários, presença de anticoagulante lúpico positivo e deficiência da antitrombina.
- B) Pode-se encontrar, no exame físico, o sinal de Frank relacionado à causa dos fenômenos apresentados.
- C) O achado de “mãos de mecânico” e o HLA-B27 têm forte relação com esse quadro clínico.
- D) A presença de elevação da atividade das proteínas C e S no sangue periférico está intimamente relacionada ao quadro clínico, bem como ao histórico pessoal e familiar da paciente.

### QUESTÃO 62

Sobre a *cutis verticis gyrata*, assinale a alternativa correta.

- A) Frequentemente se relaciona à deficiência mental.
- B) As lesões clinicamente se assemelham com as vilosidades intestinais.
- C) Não é passível de correção cirúrgica.
- D) Pode se associar com a síndrome de Noonan.

### QUESTÃO 63

Analise o caso clínico a seguir.

Criança, sexo masculino, 11 meses de idade, é trazida pelos pais em consulta dermatológica. Começou a frequentar creche comunitária há dois meses, e o desenvolvimento da criança vem ocorrendo de forma normal. Os pais referem que há um mês a criança apresenta lesões tipo “pequenas bolinhas vermelhas” que coçam no abdome, axilas, nádegas, escroto e pênis. Fez uso tópico de betametasona com cetoconazol. Em cinco dias, as lesões diminuíram em número e tamanho, porém voltaram e se estenderam para tórax, abdome, couro cabeludo, palmas e plantas após término da medicação. Os pais referem surgimento há uma semana de pequenas bolhas com pus, que se rompem e descamam. Ao exame dermatológico, observam-se pápulas escoriadas e eritematosas, de 2 a 4 mm, no abdome, axilas, palmas e plantas; pústulas com base eritematosa de 2 a 5 mm, crostas melicéricas e descamação em colarete na face e na área perinasal. Não havia história de febre e, no exame físico, não se observam púrpura ou linfadenopatias.

Considerando esse caso clínico, assinale a alternativa correta.

- A) O quadro dermatológico inicial é compatível com doença de Gianotti-Crosti e, pelo uso da medicação tópica, ocorreu o desenvolvimento de candidíase.
- B) O diagnóstico inicial é de histiocitose de células de Langerhans, que complicou com uma erupção variceliforme de Kaposi.
- C) O uso do creme tópico sobre um quadro inicial de miliária promoveu uma tinha incógnita como complicação dessa terapia.
- D) A hipótese mais consistente é de escabiose, complicada após terapia inadvertida, com infecção pelo *Staphylococcus aureus*.

### QUESTÃO 64

Em relação ao erisipeloide, assinale a alternativa correta.

- A) O seu agente etiológico pode ocorrer, na natureza, em mamíferos, pássaros e peixes.
- B) O bacilo pode ser pesquisado por coloração pelo método de Grocott.
- C) Acomete, em geral, os pés, poupando as falanges terminais.
- D) O diagnóstico de erisipeloide deve ser baseado em obtenção do cultivo do bacilo em meio de Lowenstein-Jensen.

### QUESTÃO 65

Em relação à angiomatose bacilar, assinale a alternativa correta.

- A) É causada por bacilos Gram-positivos ou cocobacilos grandes.
- B) As formas sistêmicas da doença são as mais comuns (55 a 90% dos casos).
- C) O acometimento hepático e esplênico ocorre sob a forma denominada peliose bacilar.
- D) Na histopatologia, a histoquímica de Fontana-Masson é essencial para se visualizar o agregado basofílico granular de bactérias.

### QUESTÃO 66

Em relação à embriologia cutânea, assinale a alternativa correta.

- A) O epitélio estratificado com quatro camadas se forma no final da gestação.
- B) Os melanócitos originam-se de células do mesênquima no segundo trimestre de gestação.
- C) As glândulas sebáceas originam-se de invaginações das bainhas do folículo piloso.
- D) Os folículos pilosos iniciam seu desenvolvimento no terceiro trimestre da gestação.

### QUESTÃO 67

Sobre a urticária, assinale a alternativa correta.

- A) A urtica é causada por extravasamento de fluido intravascular para a derme, fenômeno que constitui a primeira etapa da tríplice reação de Lewis.
- B) Urticárias de origem autoimune são mediadas por IgE, sendo que imunocomplexos e hipersensibilidade tardia não causam lesões desse padrão.
- C) As urticárias medicamentosas são imunologicamente mediadas e independem do efeito da droga sobre o receptor de mastócito.
- D) São exemplos de doenças autoinflamatórias genéticas que cursam com urticária: síndrome de Muckle-Wells, síndrome familiar autoimune ao frio, síndrome de hiper-IgD e síndrome CINCA.

### QUESTÃO 68

Livedo reticular, manchas purpúricas e necrose levando a úlceras estelares simetricamente distribuídas, localizadas no tronco e glúteos, mas podendo acometer também extremidades, compõem a descrição de uma entidade potencialmente grave e fatal.

Esse quadro clínico corresponde ao diagnóstico de

- A) distúrbios do cálcio na insuficiência renal.
- B) alterações do fibrinogênio na sepse.
- C) crioglobulinemia na hepatite B.
- D) hipovitaminose C no escorbuto.

### QUESTÃO 69

Assinale a alternativa que apresenta as manifestações iniciais mais proeminentes da doença enxerto *versus* hospedeiro.

- A) Diarreia, elevação das bilirrubinas e erupção maculopapulosa.
- B) Febre, elevação de transaminases e erupção liquenoide.
- C) Mialgia, alteração da função renal e mucosite.
- D) Artralgia, distúrbios hidroeletrólíticos e esclerodermia.

### QUESTÃO 70

Analise as sentenças a seguir sobre a síndrome de Sweet.

- I. Lesões papulonodulares, pseudovesiculosas, placas anulares, bolhas ou úlceras são possíveis manifestações clínicas.
- II. Lesões oculares, como conjuntivite, episclerite e iridociclite, são frequentemente associadas a malignidades.
- III. Podem ocorrer lesões extracutâneas com comprometimento articular, pulmonar, neurológico, cardíaco, hepático, renal, ósseo e pancreático.
- IV. São suficientes para o diagnóstico os achados de pápulas e placas eritematosas dolorosas, febre e rápida resposta ao corticoide.

Estão corretas as sentenças

- A) I e II, apenas.
- B) II e IV, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.

### QUESTÃO 71

Em relação ao pioderma gangrenoso, assinale a alternativa incorreta.

- A) Crianças apresentam lesões atípicas, como a variante vegetante, e o acometimento é predominante nas extremidades.
- B) Manifestações extracutâneas podem ocorrer principalmente nos pulmões, nas articulações e no trato gastrointestinal.
- C) São consideradas para diagnóstico úlcera de borda subminada, dermatose neutrofilica à histologia e resposta rápida à corticoterapia.
- D) As formas bolhosas são mais relacionadas às doenças hematológicas, e as formas pustulosas, mais relacionadas à doença inflamatória intestinal.

### QUESTÃO 72

Em relação à dermatomiosite, assinale a alternativa correta.

- A) A forma juvenil é classicamente associada ao HLA-B35.
- B) A infecção pelo picornavírus é fator desencadeante.
- C) O anticorpo anti-Mi2 é preditivo de comprometimento pulmonar.
- D) O sinal de Gottron é o surgimento de pápulas na região dorsal das mãos.

### QUESTÃO 73

Considere que um paciente, sexo masculino, 21 anos de idade, apresenta úlceras orais dolorosas recidivantes há um ano e úlceras genitais e, posteriormente, evoluiu com perda de acuidade visual. Também apresenta eritema nodoso nos membros inferiores, além de artrite do joelho esquerdo. Tem antígeno HLA-B51 e teste de patergia positivos.

Nesse caso, pode-se afirmar que

- A) o paciente tem critérios de pior prognóstico de sua doença.
- B) a perda visual deve ser por alteração do sistema nervoso central.
- C) o eritema nodoso não faz parte da doença de base.
- D) o exame histológico não tem infiltrado neutrofílico ou vasculite.

### QUESTÃO 74

Com relação ao tratamento do lúpus eritematoso com antimaláricos, assinale a alternativa correta.

- A) Com doses de cloroquina de até 4 mg/kg/dia, o risco de toxicidade ocular é pequeno.
- B) A resposta terapêutica é rápida, podendo ser observada já na segunda semana de uso regular da droga.
- C) O fumo e o álcool não interferem na resposta terapêutica à hidroxicloroquina e à quinacrina.
- D) A quinacrina não é considerada a primeira escolha em função da alta taxa de toxicidade retiniana.

### QUESTÃO 75

Em relação ao pseudoxantoma elástico, assinale a alternativa correta.

- A) O quadro cutâneo é composto por pápulas hiperkeratóticas de disposição serpiginosa, localizadas nas extremidades superiores e na região cervical.
- B) O defeito molecular ocorre no gene ANTXR2 que codifica a proteína 2 da morfogênese capilar, provocando deposição de material hialino na derme.
- C) Na histologia, observam-se fibras elásticas encurtadas, fragmentadas, em menor número, especialmente na derme média e profunda.
- D) Entre as lesões oculares descritas estão as estrias angioides, degeneração maculosa retiniana e hemorragias.

### QUESTÃO 76

Sobre a síndrome de Bloom, assinale a alternativa correta.

- A) A fotossensibilidade surge na primeira infância e tende a aumentar com a idade.
- B) O eritema telangiectásico surge na adolescência e compromete a face e o tronco.
- C) Nos portadores da síndrome, ocorre atraso no desenvolvimento intelectual, porém o crescimento pênfigo-estatural é normal.
- D) Há aumento da incidência de neoplasias linfoproliferativas nos portadores da síndrome.

### QUESTÃO 77

Em relação aos pênfigos, assinale a alternativa correta.

- A) No pênfigo vulgar, o comprometimento mucoso é frequentemente tardio e ocorre após as lesões cutâneas.
- B) No pênfigo por IgA, o tratamento com dapsona não está indicado, devido à baixa resposta.
- C) No pênfigo paraneoplásico, o achado histopatológico é de dermatite de interface com acantólise intraepidérmica.
- D) No pênfigo induzido por drogas, os medicamentos mais comuns são os antibióticos beta-lactâmicos.

### QUESTÃO 78

Em relação ao penfigoide das membranas mucosas, assinale a alternativa correta.

- A) Predomina no sexo masculino, na terceira década de vida e em caucasianos.
- B) A presença de anticorpo antilaminina 332 tem associação com neoplasias.
- C) O comprometimento da pele é comum, com bolhas persistentes e cicatrizes.
- D) Na imunofluorescência, há predomínio de depósito granular de IgG.

### QUESTÃO 79

Em relação às complicações da dermatite atópica, assinale a alternativa incorreta.

- A) A erupção variceliforme cursa com quadro febril e lesões vesicopustulosas disseminadas principalmente nas áreas eczematosas.
- B) As infecções bacterianas são associadas principalmente a *S. aureus* e podem provocar o surto inicial da dermatite.
- C) A alteração ocular mais frequente é o ceratocone, seguida da uveíte e da catarata.
- D) O retardo no crescimento estatural pode ocorrer associado a quadros graves, extensos ou eritrodérmicos.

### QUESTÃO 80

A clivagem ao nível da sublâmina densa é observada no seguinte tipo de epidermólise bolhosa:

- A) Dowlig–Meara.
- B) Herlitz.
- C) Acantolítica letal.
- D) Distrófica dominante generalizada.



**FOLHA DE RESPOSTAS  
(VERSÃO DO CANDIDATO)**

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
66	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
69	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
71	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
74	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
77	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
79	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D
80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**